Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Maestría en Biología

**“Caracterización morfológica y genética de progenitores y
progenie de dos poblaciones silvestres de *Chirostoma*
humboldtianum (Valenciennes, 1835)”**

T E S I S
PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS

PRESENTA:
Karen Yazmin Ruiz Mondragón

Cotutores:
Dra. Irene de los Angeles Barriga Sosa
Dr. Gerardo Figueroa Lucero

Asesor:
Dr. Miguel Ángel del Río Portilla

El jurado designado por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la
unidad Iztapalapa aprobó la tesis que presentó

Karen Yazmín Ruiz Mondragón

El día 9 de diciembre del 2019

Codirectores:

DRA. IRENE DE LOS ANGELES BARRIGA SOSA (Tutor)_____

DR. GERARDO FIGUEROA LUCERO (Tutor) _____

Jurado:

DR. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO PORTILLA (Presidente)_____

DRA. ERIKA MAGALLÓN GAYÓN (Secretaria) _____

DRA. GABRIELA CASTELLANOS MORALES (Vocal) _____

DRA. ROSA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ (Vocal) _____

COMITÉ TUTORAL

COTUTORES DE TESIS:

DRA. IRENE DE LOS ANGELES BARRIGA SOSA

Departamento de Hidrobiología – UAM Iztapalapa

DR. GERARDO FIGUEROA LUCERO

Departamento de Hidrobiología – UAM Iztapalapa

ASESOR:

DR. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO PORTILLA

Departamento de Acuicultura – Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada - CICESE

SINODALES:

DRA. GABRIELA CASTELLANOS MORALES

Departamento de Conservación de la Biodiversidad - El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR,
Villahermosa

DRA. ERIKA MAGALLÓN GAYÓN

Departamento de Hidrobiología – UAM Iztapalapa

DRA. ROSA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ

Departamento de Zoología -Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN

El presente trabajo se realizó en:

El Laboratorio de Genética y Biología Molecular y El Laboratorio de Reproducción
en la Planta Experimental de Producción Acuícola de la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Iztapalapa, bajo la dirección de:

Dra. Irene de los Angeles Barriga Sosa

y

Dr. Gerardo Figueroa Lucero

La investigación se realizó con los apoyos del proyecto PRODEP-28967 y con el
apoyo de la beca CONACyT -634040 por ser alumna del Posgrado de Ciencias
Biológicas y de la Salud en la Maestría en Biología en la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Iztapalapa

Agradecimientos

Quiero agradecer en primera instancia a CONACYT por la beca brindada, al posgrado, a la comisión de Maestría de la UAM-I y en especial a mis directores de tesis, la Dra. Irene Barriga Sosa y el Dr. Gerardo Figueroa, por permitirme formar parte de sus equipos de trabajo y laboratorios, por su dirección, por instruirme y apoyarme en todo los momentos durante el desarrollo de la tesis, estar presentes y tomarme en cuenta en los diversos aspectos académicos. Quiero agradecer a la Dra. Irene por tener confianza en mí y apoyarme en la asistencia al Congreso LACQUA 2019, lo cual fue muy enriquecedor para mi formación. A mi asesor de tesis el Dr. Miguel del Río, por su educación brindada en cuestiones de bioinformática, por orientarme y leer mi tesis en diversas ocasiones.

Agradezco infinitamente a mi ex tutora y ahora sinodal la Dra. Gabriela Castellanos, gracias por haberme enseñado tanto desde el inicio de nuestra relación y siempre aportando algo nuevo, por ayudarme en cualquier duda existencial y por el sostén incondicional en todos los aspectos de la vida, por hacerme sentir en casa cuando me encontraba haciendo una estancia en ECOSUR, Villahermosa y sobre todo por su apoyo en uno de los momentos mas difíciles de mi vida, cuando mi papá dejó esta vida terrenal. Gracias por estar en ese momento y por siempre brindarme tu apoyo y sabiduría en cualquier ocasión.

A mis sinodales, la Dra. Erika Magallón y la Dra. Rosa García por aceptar ser parte de mi jurado y por sus comentarios y sus enseñanzas. Muchas gracias a Scarlett Prieto del Laboratorio de Genética y Biología Molecular, por hacer esos momentos más divertidos y por la confianza mutua. A Octavio Abeja y Andrea Hernández, integrantes del Laboratorio de Reproducción en PExPA, por enseñarme cuestiones del manejo de los peces y por brindarme soporte durante la generación de mi F1 (bebés).

Un agradecimiento a mis amigos de la maestría Mariela Gazca, Ale Flores y Alonso Castro, por las risas, por el estrés en las aulas, porque siempre nos compartimos conocimiento, por su amistad y por los momentos agradables. A mis mejores amigos de la vida Mágica del Río, Elsa Magdaleno y Zaid Medina por su apoyo incondicional en todos los aspectos de mi vida.

A mi familia que tanto amo, a mi mami especialmente por enseñarme que con perseverancia logras consolidar grandes cosas, a mi daddy Gab por siempre darme su apoyo sin pensarlo dos veces, a mis hermanos Adrián y Pam y a mis cuñis Barbie y Omar, por su apoyo eterno; porque todos ellos son el pilar y lo mas importante en mi vida, siempre los amaré. A Silvia, por su sostén, en cuanto a mi padre, a mi pá Paco que diariamente pienso en ti. A mis suegros Marcia y Sergio, por su cariño.

Por último, agradezco infinitamente a la persona más importante para mí, a mi compañero de vida, mi mejor amigo, mi confidente, mi amor Alfonso Aceves gracias cariño, por ser mi luz en todo momento, mi virtud, por enseñarme siempre a ver hacia delante y no temer a nada en esta vida. Gracias por estar presente en todos los mejores momentos o incluso en los más difíciles. Gracias por tener una confianza eterna hacia mí, gracias por enseñarme a ser fuerte a nunca darme por vencida y gracias por recorrer este camino de la vida siempre juntos. Te amo.

Gracias vida por todo lo que me has enseñado y dado.

Para Alfonso

*“No es cursi decirle Te amo,
es una confesión heroica;
No es cursi decirle Me haces falta
es humildad emocional.
No es cursi decirle Te quiero;
Es saber agradecer el milagro de su existencia”*

Alejandro Jodorowsky

*“We especially need imagination in science.
It is not all mathematics, nor all logic,
But is somewhat beauty and poetry”
Maria Mitchell –Astronomer-*

Índice

AGRADECIMIENTOS.....	4
SIMBOLOGÍA	7
RESUMEN	8
INTRODUCCIÓN	9
ANTECEDENTES	10
<i>Historia evolutiva del género Chiostoma</i>	10
<i>Sujeto de estudio</i>	12
<i>Clasificación taxonómica Chiostoma humboldtianum (Barbour, 1973a)</i>	12
<i>Descripción morfológica</i>	12
<i>Distribución y hábitat</i>	13
<i>Biología reproductiva de Chiostoma humboldtianum</i>	15
<i>Evaluación del desempeño de Chiostoma humboldtianum en cautiverio</i>	16
<i>Estudios genéticos en Chiostoma humboldtianum</i>	17
MARCO TEÓRICO	21
<i>Acuicultura e hibridación</i>	21
<i>Ontogenia</i>	23
<i>Conservación in situ y ex situ</i>	24
<i>Genética de la conservación</i>	24
<i>Fuerzas evolutivas</i>	28
<i>Marcadores moleculares</i>	35
JUSTIFICACIÓN	36
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	37
HIPÓTESIS.....	37
OBJETIVOS	38
<i>Objetivo general</i>	38
<i>Objetivos particulares</i>	38
MÉTODOS.....	39
<i>Cruzas de reproductores y generación F1</i>	39
<i>Análisis de Supervivencia y Morfológicos</i>	40
<i>Extracción de ADN total (ADNt) de reproductores y F1</i>	41
<i>Genotipificación de poblaciones silvestres, reproductores y F1</i>	42
<i>Análisis Genéticos</i>	44
RESULTADOS	48
<i>Cruzas de reproductores y generación F1</i>	48
<i>Análisis de Supervivencia y Morfológicos</i>	52
<i>Análisis Genéticos</i>	56
DISCUSIÓN	64
<i>Cruzas de reproductores y generación F1</i>	64
<i>Supervivencia y Morfología</i>	65
<i>Genética</i>	67
<i>Manejo y conservación</i>	77
CONCLUSIONES	81
BIBLIOGRAFÍA	82
APÉNDICE	94
1. <i>Apéndice. Extracción de DNA</i>	94
2. <i>Apéndice. Morfología</i>	94
3. <i>Apéndice. Genética</i>	96

Simbología

<i>H-W</i>	Equilibrio de Hardy-Weinberg
<i>H_O</i>	Heterocigosis Observada
<i>H_E</i>	Heterocigosis Esperada
<i>F_{IS}</i>	Coefficiente de endogamia
<i>F_{ST}</i>	Distancia genética
<i>LT</i>	Longitud Total
<i>LNC</i>	Longitud Notocordal
<i>P</i>	Peso
<i>N</i>	Número total de individuos, muestras analizadas
<i>T</i>	Población silvestre Tiacaque
<i>T_x</i>	Población silvestre Tepuxtepec
<i>RT</i>	Reproductores de la craza Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂
<i>PT</i>	Progenie de la craza Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂
<i>RT_x</i>	Reproductores de la craza de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂
<i>PT_x</i>	Progenie de la craza Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂
<i>F1</i>	Progenie

Resumen

Chirostoma humboldtianum (Valenciennes, 1835), es una especie de pez blanco, endémica de México, que habita de manera discontinua en sistemas lénticos desde el Estado de México hasta Nayarit, a lo largo de las cuencas del Río Lerma-Santiago. Esta especie tiene importancia biológica, económica y social ya que desde la época precolombina ha sido consumida por los habitantes de la región. Hoy en día, se han observado declives poblacionales aunados a fragmentación del hábitat, sobreexplotación, introducción de especies exóticas y contaminación de los lagos en el Valle de México. El objetivo del presente trabajo fue evaluar dos poblaciones silvestres (Tiacaque, Edo. México (T) y Tepuxtepec, Michoacán (Tx)) y realizar el cruzamiento de las mismas poblaciones que se encuentran en cautiverio en la Planta Experimental de Producción Acuícola (PExPA), con la finalidad de determinar la existencia de barreras reproductivas en la F1, su diversidad genética y morfológica, así como comparar la diversidad con las poblaciones silvestres y el lote reproductor; para orientar su manejo acuícola y contrarrestar la sobreexplotación de la especie, además de contribuir al conocimiento y conservación de esta especie endémica.

Se llevaron a cabo fertilizaciones *in vitro* a través de la extracción de gametos femeninos y masculinos de organismos presentes de dos poblaciones en cautiverio en PExPA UAM-I. (Tiacaque y Tepuxtepec). Se le dio seguimiento a la F1 durante el desarrollo temprano desde el momento de la activación del huevo hasta el periodo juvenil. Se cuantificó la sobrevivencia. El análisis morfológico, consistió en el registro del tamaño corporal (LT, LNC) y el peso de los peces (P). Los análisis genéticos consistieron en la evaluación, por medio de análisis de diversidad y estructura genética y análisis de parentesco, de una muestra de cada una de las poblaciones silvestres, los juveniles y reproductores con ocho *loci* microsatelitales nucleares.

La mayor sobrevivencia se presentó en la cruce de T ♀ X Tx ♂ con 17.47%, mientras que la cruce de Tx ♀ X T ♂ fue de solo 3%. La población silvestre de Tepuxtepec presentó mayor número de heterocigotos observados (Tx; $H_E = 0.759$), mientras que la F1 (PT) obtuvo el menor número de heterocigotos en todas las poblaciones analizadas $H_E = 0.414$. Todas las poblaciones mostraron un número significativo, positivo y alto en el coeficiente de endogamia (F_{IS}). Se observó una fuerte estructura genética con tres pozas génicas diferenciadas ($K=3$), en donde las poblaciones silvestres T y Tx presentan cada una su propia poza génica, mientras que los individuos en cautiverio (reproductores y F1) comparten una misma poza génica con flujo génico entre ellas. La fuerte estructura poblacional y la pérdida de heterocigotos sugiere una tendencia hacia la adaptación al entorno cautivo, un proceso de efecto fundador y por lo tanto una pérdida de diversidad genética; mientras que en las poblaciones silvestres, la pérdida de variación genética puede ser debido a la fragmentación y pérdida del hábitat, a eventos de cuello de botella, deriva génica y un bajo tamaño efectivo poblacional, relacionado con la historia evolutiva de la especie. Se sugiere, considerar estos resultados para orientar la eficiencia en las prácticas del manejo de la especie tanto en cautiverio como en las poblaciones silvestres.

Palabras Clave: *Chirostoma humboldtianum*; fertilizaciones *in vitro*; *loci* microsatelitales; ontogenia; diversidad genética; exogamia; endogamia; estructura genética.

Introducción

El sistema Lerma-Santiago en la Mesa Central de la República Mexicana se considera de gran importancia, ya que su larga historia de inestabilidad geológica y fisiográfica ha ocasionado anastomosis de ríos y separación de cuencas, lo que ha propiciado una dispersión característica y el desarrollo de un gran centro ictiológico de endemismos en el país (Miller y Smith, 1986). Un ejemplo lo constituye el género *Chirostoma*, que pertenece a la familia Atherinopsidae, conformado por 18 especies y 6 subespecies (Barbour, 1973a) y es un taxón controversial en cuanto a su origen, colonización y diversificación en el Altiplano mexicano. La especie *Chirostoma humboldtianum*, habita en la región del Río Lerma, que se caracteriza por un alto grado de urbanización e industrialización. Esto afecta en diferente grado la calidad del aire, agua, suelo y a las comunidades biológicas que se desarrollan en la misma. *C. humboldtianum* fue la primera especie íctica descrita por la ciencia en México y es una de las especies de peces blancos que conserva el patrón de distribución más antiguo del género *Chirostoma* (Barbour, 1973b; Paulo-Maya et al., 2000). Los procesos de diversificación del género están relacionados con la especialización del aparato mandibular (Paulo-Maya et al., 2000), sin embargo, existe un escaso número de estudios sobre la cruce entre poblaciones de la misma especie con diferentes características fenotípicas y genotípicas. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es evaluar aspectos relacionados con la presencia de mecanismos de aislamiento reproductivo durante el desarrollo temprano entre cruces recíprocas de dos poblaciones de *C. humboldtianum* procedentes del Alto Lerma y el comportamiento de la diversidad genética entre progenitores y progenie con la idea de seleccionar organismos adecuados para cultivo acuícola y repoblación.

Antecedentes

Historia evolutiva del género *Chirostoma*

El género *Chirostoma*, perteneciente a la familia Atherinopsidae (Dyer y Chernoff, 1996; Nelson et al., 2016), es endémico de la Mesa Central de México (Barbour, 1973b; Echelle y Echelle, 1984). De acuerdo con Barbour (1973a), se encuentra dividido en dos grandes grupos sin valor taxonómico, el grupo Jordani, que incluye a especies con valores morfométricos y merísticos altos: *C. jordani*, *C. humboldtianum*, *C. patzcuaro*, *C. chapalae*, *C. consocium*, *C. estor*, *C. grandoucle*, *C. lucius*, *C. sphyraena* y *C. promelas* y el grupo Arge, por lo general con valores merísticos menores e incluyen a: *C. arge*, *C. melanocus*, *C. riojai*, *C. charari*, *C. attenuatum*, *C. bartoni*, *C. labarcae* y *C. aculeatum*.

Existen diversas teorías evolutivas del género *Chirostoma*. De acuerdo con Barbour (1973b), y con base en 19 caracteres morfométricos y 9 merísticos propone un origen difilético (grupo Jordani y Arge) en donde describe que, durante el Terciario y principios del Pleistoceno, el ancestral Río Lerma probablemente fluyó hacia el oeste, quizás a través de una serie de lagos, hasta el Océano Pacífico. La elevación de la Mesa Central durante el Pleistoceno medio produjo una fragmentación en los sistemas fluviales y una especie antigua relacionada con *Menidia* quedó atrapada en aguas continentales la cual dio origen al grupo Jordani. Además propone dos centros de evolución para el grupo Jordani: la cuenca de Chapala y los lagos Uruapan-Pátzcuaro y Zirahuén, Michoacán. Por otro lado, postula que un ancestro relacionado con la especie *Melaniris* dio origen al grupo Arge (constituido por charales). También se menciona que las especies del grupo Jordani fueron las que diversificaron primero, probablemente a través de una especie muy similar a las poblaciones orientales de *C. humboldtianum*. Mientras que las especies del grupo Arge ocuparon los últimos nichos vacíos de pequeñas especies en las comunidades lacustres.

Por su parte, Miller (1966) y Miller y Smith (1986) proponen que entre el Plioceno y el Pleistoceno, una especie relacionada con el género *Menidia* penetró al territorio mexicano en donde hubo una dispersión íctica colonizadora en un sentido longitudinal de este a oeste de organismos que provenían del río Bravo desde la costa del Atlántico, que se encontraba conectado con la Mesa Central a través de un río que posiblemente se dirigía hacia el sur y dicha especie ancestral quedó atrapada en aguas continentales. Echelle y Echelle (1984), con análisis fenético y cladístico con marcadores moleculares de isoenzimas, resuelven una topología difilética y mencionan que formas similares a *Menidia* invadieron la Mesa Central a través de los ríos de la Costa del Golfo al Sur del Río Grande y concluyen que el género *Chirostoma* tienen un ancestro en común con *Menidia*, no compartido con ningún otro género de atherinópsidos.

Recientemente se han realizado diversos estudios filogenéticos del orden Atheriniformes, en donde la monofilia del género *Chirostoma* es apoyada por diez rasgos morfológicos sinapomórficos (Dyer y Chernoff, 1996). Así como también respaldada por análisis moleculares de mitogenomas (Setiamarga et al., 2008) y mediante análisis de citocromo b, nd2 y RAG-1 (Bloom et al., 2009, 2012, 2013). De acuerdo con Campanella et al. (2015) la distribución actual de los Atheriniformes es más probable que sea el resultado de una dispersión oceánica. Esta hipótesis es consistente con el amplio rango de tolerancia a la salinidad mostrado por los miembros de este grupo (Bloom et al., 2013; Campanella et al. op. cit.). Existe evidencia en donde los autores mencionan que los linajes marinos podrían pasar a un estado dulceacuícola (y viceversa) a través de un estado intermedio por medio de diferentes adaptaciones a lo largo del tiempo (De Faveri et al., 2011; Jones et al., 2012; Bloom et al., 2013) lo cual conlleva al proceso de especiación. Además, dentro de Atherinopsidae, en las subfamilias Atherinopsinae y Menidiinae se reportó una alta probabilidad (76%) de que su ancestro fuese una especie marina.

De acuerdo con Bloom et al. (2013) y Campanella et al. (2015), el tiempo de divergencia de

los Atherinopsidae es de 36.94 millones de años (ma), mientras que para Menidiinae se estimó un tiempo de divergencia de 26.89 ma, el género *Chirostoma* se resuelve como monofilético y el más reciente con una divergencia de 0.52 ma. Los últimos autores calibraron el reloj molecular utilizando tres fechas fósiles y se puede observar que *Chirostoma humboldtianum*, se resuelve como la especie basal o más antigua de los peces blancos. En el trabajo descrito, concluyen que las transiciones de los peces marinos al agua dulce, da como resultado una especiación acelerada y esta especiación en la Mesa Central mexicana, fue el resultado de una oportunidad ecológica para la diversificación debido a una reducida competencia.

Sujeto de estudio

Clasificación taxonómica *Chirostoma humboldtianum* (Barbour, 1973a)

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Actinopterygii

Orden: Atheriniformes

Familia: Atherinopsidae

Género: *Chirostoma*

Especie: *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes, 1835)

Descripción morfológica

Su longitud máxima es aproximadamente de 200-250 mm; cuerpo esbelto; hocico romo o subtriangular, una mandíbula inferior que se proyecta levemente; dientes pequeños cónicos, ocasionalmente presentes en vómer; escamas de líneas laterales con canales; escamas predorsales ligeramente puntiagudas. El tamaño de la cabeza es de 25.6 a 34.2 cm; la longitud de la cabeza postorbital es de 12.2-16.8; longitud del ojo, 4.6-7.8; el tamaño de la boca es de 8.4-13.4; la longitud de la mandíbula, 9.5-15; las branquiospinas, 19-28 ($\bar{x}$ = 23); longitud del hocico a la aleta pélvica, 40.9-51.2 ($\bar{x}$ = 44.0); longitud de la base de la aleta anal 17.1-22.2 ($\bar{x}$ =19.4); escamas laterales medias, 47-73 ($\bar{x}$ =60); escamas predorsales, 24-50 (Barbour, 1973a).

De acuerdo con Alarcón-Durán et al. (2017) en donde se evaluaron seis poblaciones de *C. humboldtianum* mediante morfometría geométrica, se encontraron diferencias significativas en la altura del cuerpo y la separación de las aletas dorsales, siendo la población de Tepuxtepec, Michoacán y San Pedro Lagunillas, Nayarit, las más divergentes, mostrando una figura más diferenciada. Mientras que las poblaciones de Tiacaque, Villa Victoria, Estado de México, y Zacapu, Michoacán, mostraron una mayor similitud. Dos de estas poblaciones (Tepuxtepec y Tiacaque) son las que se utilizarán en este trabajo, ya que morfológicamente son las que presentan una mayor divergencia.

Distribución y hábitat

Las provincias biogeográficas que abarcan el área de distribución del género *Chirostoma* son: La Provincia de la Sierra Madre Occidental (PSMO), el Eje Neo Volcánico (ENT), el Altiplano Sur (AS) y la Mesa Central (MC) la cual surgió durante el Eoceno. La MC se encuentra en el extremo sur de la meseta mexicana, entre las grandes cadenas montañosas, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y se extiende desde el Río Grande (Río Bravo) hasta el eje Neo Volcánico, que se extiende entre los paralelos 19 y 20 (Echelle y Echelle, 1984). En la actualidad, el sistema fluvial Lerma-Santiago, es la principal cuenca de la Mesa Central. El Río Grande de Santiago, que desemboca en el océano Pacífico, se origina en el extremo oriental del lago de Chapala, cerca de la desembocadura del río Lerma, que desemboca en el lago de Chapala, al este. La Mesa Central también posee una gran cantidad de cuencas interiores. Incluyen el Valle de México, y los Llanos de Puebla al este, los Lagos Santa María y Juan Acatlán al oeste, el Valle de Tocombo cerca de la cuenca del Lago de Chapala, y los lagos Zirahuén, Pátzcuaro y Cuitzeo, en Michoacán (Echelle y Echelle, 1984).

Chirostoma humboldtianum es la única especie del género que presenta la más amplia distribución de manera natural (Figura 1) y la que conserva el patrón de distribución más antiguo del género *Chirostoma* (Barbour, 1973b), su distribución es discontinua a lo largo de la cuenca del Río Lerma-Santiago desde el Estado de México hasta Nayarit, siendo altamente disyunta, ya que habita desde la vertiente del Pacífico, cuenca del río Lerma (incluida la Laguna de Zacapu), la Laguna Santa María (afluente del río Grande de Santiago), sureste de Tepic, Nayarit (extirpado); cuencas interiores, lagos en el Valle de México (extirpado); Laguna de Juanacatlán, al norte de Barra de Navidad, Jalisco y la Laguna San Pedro Lagunillas, Nayarit. Habita en sistemas lénticos y canales asociados (Barbour, 1973b) con temperaturas que oscilan de 6 a 25 °C.

De acuerdo con Paulo-Maya et al. (2000) la especie tiene preferencia por la zona limnética en aguas superficiales; en cuerpos de agua del Alto Lerma se encuentra entre 2170 msnm y 2552 msnm y en temperaturas entre 19° C y 25° C, oxígeno disuelto de 6.7 mg l⁻¹ y 7.5 mg l⁻¹ y pH de 7.5 a 8.2; sulfatos de 14 mg l⁻¹ a 26 mg l⁻¹; nitratos entre 0 mg l⁻¹ y 4.4 mg l⁻¹; fosfatos de 1.1 mg l⁻¹ a 1.58 mg l⁻¹ (Chávez-Toledo, 1987; Díaz-Pardo y Chávez-Toledo, 1987).

Figura 1. Mapa de distribución de diferentes presas y lagos en donde se encuentra la especie *Chirostoma humboldtianum*. Tomado de García-Martínez et al. (2015) y Urbina-Sánchez et al. (2016).

Biología reproductiva de *Chirostoma humboldtianum*

Es una especie ovípara, tiene una longevidad de 3 años, en vida silvestre las hembras alcanzan su madurez sexual a los 9 meses, con desove asincrónico durante todo el año, con un pico marcado, de marzo a agosto, la época reproductiva es de seis meses (Blancas-Arroyo et al., 2003; Paulo et al., 2000), mientras que en cautiverio y particularmente para los organismos de la población de Tiacaque, su periodo de reproducción inicia al alcanzar, en promedio, 133.9 ± 2.3 mm

de talla, que corresponde a un año de edad aproximadamente, presentando sólo una época de desoves durante el año, la cual da inicio en los primeros meses del año y se extiende hasta julio y agosto (Blancas-Arroyo et al., 2003, 2004, 2008). La reproducción se lleva a cabo cerca de la superficie en áreas bien oxigenadas, con poca acción de las olas y vegetación sumergida, que sirve de sustrato para la puesta de huevos (Blancas-Arroyo et al., 2004).

Los testículos de *C. humboldtianum* son órganos pares, alargados, compactos, de aspecto lanceolado, color blanco cremoso, cubiertos por una túnica albugínea; localizados en la región dorsal de la cavidad abdominal, conforme se desarrollan, cubren el tubo digestivo y llegan a ocupar la mayor parte de la cavidad abdominal (Uria et al., 1998). Histológicamente, están revestidos por la túnica albugínea, de tejido conjuntivo denso e irregular con escasas fibras colágenas, fibroblastos y células pigmentarias, estas células se proyectan al interior de la gónada formando, septos que dividen el testículo en lóbulos. Los lóbulos son de aspecto irregular y la longitud depende del estadio de madurez, en conjunto forman el elemento tubular del testículo. Los túbulos se disponen en forma radial en relación con los conductos eferentes, los cuales conducen a los espermatozoides al conducto principal. Cada túbulo tiene numerosos cistos, asincrónicos, delimitados por células de Sertoli. Conforme se alcanza la madurez gonádica los cistos se abren hacia los conductos eferentes y vacían el contenido espermático (Uria et al. 1998).

Evaluación del desempeño de *Chirostoma humboldtianum* en cautiverio.

La alimentación es un factor determinante para la cría de peces, particularmente durante las primeras semanas de desarrollo, aunque los esfuerzos se han dirigido hacia el cultivo intensivo de esta y otras especies, éstas no han tenido el éxito esperado (Chacón y Rosas, 1995), debido a factores como: la alta mortalidad durante las primeras etapas de desarrollo, causada por la falta de un alimento adecuado para las etapas larvarias y la falta de conocimiento sobre aspectos morfológicos y fisiológicos involucrados en el proceso de alimentación (Figuerola-Lucero et al.

2004). De acuerdo con Navarrete y Cházaro (1992) *Chirostoma humboldtianum* es una especie zooplanctófaga cuando es pequeña y se vuelve zoobentófaga conforme crece.

En un estudio realizado por Figueroa-Lucero et al. (2004) en donde se evaluó el crecimiento, la supervivencia y el desarrollo de la mandíbula en las larvas en cautiverio de *C. humboldtianum* (Población Tiacaque) alimentadas con tres especies de rotíferos, *Brachionus rubens*, *B. calyciflorus* y *B. plicatilis*; se observó una relación entre el tamaño de la boca y la longitud notocordal, así como entre el ancho y la longitud de la mandíbula. Por otro lado, la mortalidad que se observó para el período de crecimiento fue inferior al 20% en todos los tratamientos y se concluye que la mayor ganancia de crecimiento se observó cuando las larvas de peces fueron alimentadas con el rotífero *B. rubens*, el cual es un excelente alimento para el cultivo de estas larvas, debido a su contenido en nutrientes y la facilidad de cultivo, lo que a su vez favorece el desarrollo de técnicas intensivas de cultivo con el objetivo de manejo y conservación de esta especie. Los resultados anteriores concuerdan en gran medida con otro estudio realizado por Elías-Fernández et al. (2008), en donde hacen mención que *Chirostoma humboldtianum*, en época juvenil, consumió 21 tipos de organismos; rotíferos, cladóceros, copépodos (los órdenes Cyclopoida y Calanoida), hemípteros, dípteros (quironómidos), tricópteros y coleópteros. En el trabajo concluyen que el grupo más consumido en las primeras tallas fue el de los rotíferos.

Estudios genéticos en *Chirostoma humboldtianum*

Existen diversos estudios moleculares en donde los autores mencionan importantes diferencias morfológicas y genéticas en las poblaciones de *C. humboldtianum* (isoenzimas y secuencias de 16S y Citocromo b; Barriga-Sosa, 2001; Barriga-Sosa et al., 2002). Recientemente, García-Martínez et al. (2015) analizaron la genética de poblaciones de *C. humboldtianum*, utilizando secuencias de ADN mitocondrial e incluyendo muestras de ubicaciones a lo largo de toda la distribución de la especie; encontraron evidencia de una fuerte estructura genética,

detectando la presencia de al menos seis pozas génicas, las cuales son candidatas para ser preservadas como Unidades Evolutivas Significativas (ESU); ya que cada una de estas poblaciones contiene una parte de la variación genética total de la especie, se encuentran reproductivamente aisladas y por sus características únicas a nivel morfológico y genético (García-Martínez, et al. 2015). Definir ESU es un objetivo principal para los programas de conservación (Waples, 1992; Vrijenhoek 1998). Dado que no todas las poblaciones en peligro de extinción pueden contar con protección, algunas poblaciones o especies pueden recibir prioridad de gestión en función de su grado de diversidad, singularidad evolutiva, o valor con respecto a otras poblaciones (Crozier y Kusmierski, 1994; Vrijenhoek 1998). En dicho estudio se analizaron 135 secuencias de la región control de la mitocondria (RC) y se encontraron un total de 60 haplotipos de los cuales 38 fueron únicos, 28 haplotipos fueron compartidos entre las localidades de Tiacque, Villa Victoria, Estado de México, Tepuxtepec, Laguna de Zacapu, y San Juanico, Michoacán. Mientras que para el citocromo b (Citb), el haplotipo más frecuente lo comparten 18 individuos de la localidad de Tiacque, Villa Victoria y Tepuxtepec. La diversidad haplotípica total para la RC fue $h = 0.945$ y la diversidad nucleotídica de $\pi = 0.035$. Para el Citb fue de $h = 0.940$ y $\pi = 0.005$. Para el presente trabajo se utilizarón los organismos de las poblaciones de Tiacque y Tepuxtepec, por lo que se describe con mayor claridad los parámetros de su diversidad genética en la Tabla 1.

Asimismo, se han analizado a las mismas poblaciones con ocho *loci* microsatelitales aislados a partir de una genoteca enriquecida (García-Martínez et al. 2014). Dicho estudio evidenció que todos los *loci* se encuentran fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg y los estimadores de la diversidad genética mostraron valores bajos de riqueza alélica, lo que los autores proponen que podría indicar que las poblaciones no son tan grandes y que la deriva génica esté actuando. De un total de 288 individuos genotipados se obtuvieron 169 alelos distintos. El valor más alto y significativo de F_{ST} pareada se observó entre el par Presa Tiacque – Presa Tepuxtepec (0.3946).

Se observa que existe exogamia en algunos *loci* para estas mismas poblaciones, las cuales son objeto de estudio en el presente trabajo, y postulan que lo anterior puede ser atribuido a la hibridación intraespecífica, es decir, a la cruce de dos genotipos o razas diferentes (García-Martínez et al. 2015). Así mismo, los autores señalan eventos de cuellos de botella, lo cual resulta en una reducción del tamaño poblacional causando desviaciones al equilibrio de Hardy-Weinberg por deficiencia de heterocigotos.

Tabla 1. Diversidad mitocondrial con RC y Cytb así como con ocho loci microsatélites nucleares en las poblaciones de Tiacaque y Tepuxtepec. N= número total de organismos muestreados, H_d= Diversidad haplotípica, π = Diversidad nucleotídica. RA= riqueza alélica, H_o= heterocigosis observada, F_{IS}= coeficiente de endogamia.*

Localidad	Región Control				Citocromo b				Ocho loci microsatelitales		
	N	Haplotipo	H _d	π	N	Haplotipo	H _d	π	RA	H _E	F _{IS}
Tiacaque	21	1	0	0	15	1	0	0	9.36	0.66	0.51
Tepuxtepec	25	12	0.920	0.0247	23	10	0.862	0.0029	7.91	0.59	0.25

*reportados por García-Martínez (2014), García-Martínez et al. (2015)

En otro estudio reciente, realizado por Urbina-Sánchez et al. (2016), se describe la variación cariotípica en *C. humboldtianum*, en donde se estudian las mismas seis poblaciones que en trabajos previos (García-Martínez et al. 2015; Alarcón-Durán et al. 2017) y en el cual se describe a la especie como diploide ($2n = 48$) con variación en el número fundamental y fórmula cromosómica en sus poblaciones. Se menciona que la variación del cariotipo intraespecífico es causada por reordenamientos de las inversiones de tipo pericéntrico y podría estar asociada a su distribución discontinua. También se determinan dos citotipos para la población de Tepuxtepec y uno para la población Tiacaque (Tabla 2, Figura 2), en donde además se encontró un organismo poliploide, lo cual sugiere que puede ser resultado de un mecanismo autopoliploide donde el complemento cromosómico podría derivarse de una sola especie parental.

Tabla 2. Citotipos y fórmulas cromosómicas para organismos de *C. humboltianum* de las poblaciones Tepuxtepec y Tiacaque. ND = número diploide; NF = número fundamental; FC = fórmula cromosómica. M=metacéntrico; Sm= submetacéntrico; St=subtelocéntrico; T=telocéntrico (Tomado de Urbina-Sánchez et al. 2016).

Citotipo	ND	NF	FC	Morfología de los pares					
				1	2	3	4	5	6-24
Tiacaque	2n =48	58	6M+4Sm+38T	Sm	Sm	M	M	M	T
Tepuxtepec CI	2n =48	58	8M+2Sm+38T	Sm	M	M	M	M	T
Tepuxtepec CII	4n =96	116	8M+2St+38T	St	M	M	M	M	T

Figura 2. Cariotipos e idiogramas de Tiacaque (A) y Tepuxtepec (C y D). Tomados de Urbina-Sánchez et al. (2016).

Marco Teórico

Acuicultura e hibridación

La acuicultura en México se reduce casi exclusivamente y en primer lugar al cultivo de camarón, con una producción de 130, 344 toneladas (ton); tilapia, 117, 806 ton; ostión, 53, 370 ton; carpa, 32, 122 ton; y trucha, 8, 388 ton. De las especies endémicas y de importancia acuícola como *Chirostoma estor* se producen únicamente 68 toneladas (FAO, 2016). Dentro del sector acuícola se exportaron en 2016 un total de 189,806 toneladas de productos pesqueros de especies como camarón, atún, langosta, abulón, jaiba, almeja, entre otros, representando un valor en el mercado de 1, 135 millones de dólares (SAGARPA, 2017).

Una alternativa, para diversificar la producción piscícola nacional es incorporar nuevas especies a los sistemas de cultivo. Sin embargo, desde el punto de vista biológico la introducción de especies no siempre conlleva a buenos resultados, ya que las especies exóticas son consideradas la segunda causa de pérdida de biodiversidad y se estima que la acuicultura es responsable del 40%. Para obtener una mayor producción o un mejor desempeño acuícola, muchos centros de producción de peces han optado por la formación de cruza de la misma o de diferentes especies, en donde “el vigor híbrido” o ventaja del heterocigoto, puede optimizar la producción con mayores crecimientos, resistencia a enfermedades, como efecto de la combinación de caracteres de sus parentales, mediante la exogamia (Echelle et al., 2014). En acuicultura el uso de híbridos en los cultivos comerciales se ha incrementado, buscando en el híbrido una mayor tolerancia a la variación de las condiciones ambientales y un mejor desempeño acuícola que en las especies parentales (Rodríguez-Pulido, 2016). El término híbrido se define como el descendiente de individuos de constitución genética (genotipos) distinta. También se refiere comúnmente a hijos de padres de especies u otras categorías taxonómicas diferentes (Rodríguez-Pulido op. cit.).

En la naturaleza existe la hibridación natural. Mallet (2005) demostró el papel de la hibridación en la formación de nuevas especies, difiriendo de los primeros evolucionistas, quienes la consideraban como una amenaza al aislamiento y especiación, ya que como zoólogos consideraban necesario el aislamiento del flujo génico para poder mantener las especies (Dobzhansky et al., 1968; Mayr 1989). Mallet (2005) estableció que entre un 6 y 10 % de hibridación ocurre en poblaciones animales y es de gran peso en el fenómeno de islas. La hibridación intraespecífica es ampliamente aceptada por botánicos, a pesar de que el flujo de genes puede reducir la habilidad para que la población se adapte a las condiciones locales. Generalmente híbridos interespecíficos suelen darse en especies que divergen alopátricamente y por algún evento se encuentran luego en simpatria. Sin embargo, para contrarrestar los procesos de hibridación, existen mecanismos de aislamiento reproductivo, los cuales impiden que dos especies diferentes se crucen; conocidos como mecanismos de aislamiento precigótico y postcigótico. Entre los mecanismos precigóticos, se pueden mencionar los aislamientos de tipo: mecánico, ecológico, por especificidad de los polinizadores, gamético, etológico o sexual, temporal o estacional y el aislamiento por barreras de incompatibilidad (Badii et al., 2007). Mientras que dentro de los mecanismos de aislamiento postcigótico, que impiden que los cigotos lleguen a desarrollarse, o que los híbridos alcancen el estado adulto, destacan: la inviabilidad de los híbridos, esterilidad genética, cromosómica o segregacional y el deterioro de la segunda generación híbrida (Badii et al., 2007).

Algunos de los ejemplos conocidos de hibridación natural en peces han sido descritos por Slastenenko (1957) quien enumera 212 combinaciones híbridas de las cuales solo 30 son de peces marinos o salobres. Desde la década de los años 50, muchos investigadores han reportado la producción artificial de híbridos interespecíficos e intergenéricos entre peces en la generación F1 (Buss y Wright, 1958; Suzuki, 1957; Clark, sería et al., 1954; Hubbs y Strawn, 1957; Rubinoff y Shaw, 1958).

Dos híbridos naturales han sido reportados en la familia Atherinopsidae: *Chirostoma chapalae* X *C. consocium* (Jordan y Hubbs, 1919) y *Menidia menidia* (Linnaeus) X *M. beryllina* (Cope) (Gosline, 1948; Jordania y Hubbs, 1919).

Hubbs y Drewry en 1959 realizaron una hibridación producida artificialmente de *Menidia beryllina* ♀ X *Membras martinica* ♂, el primer trabajo realizado con cruza intergénicas en Atheriniformes. La fertilización se produjo en pocos huevos. Cuatro de estos eclosionaron en cuatro días aproximadamente a 29 °C y 30 partes por mil (ppt) salinidad. Estos peces murieron cinco días después de nacer. Se reportó la ausencia de aparentes deformidades en los híbridos intergenéricos. Por su parte, Rubinoff en 1961 realizó experimentos de hibridación utilizando tres especies, *Menidia menidia*, *M. beryllina* y *Membras martinica*, en varias combinaciones. En la mayoría de los casos las tasas de supervivencia fueron bajas en los híbridos lo cual atribuyeron a una condición fisiológica de los huevos de *Menidia* y *Membras*. En el presente trabajo se realizaron las cruza intraespecíficas de dos poblaciones silvestres de *C. humboldtianum* con el fin de obtener una progenie con heterosis o vigor híbrido.

Ontogenia

La ontogenia describe los cambios durante el desarrollo de un organismo desde la fecundación del cigoto hasta la muerte (Gilbert, 2000). La teoría de la ontogenia saltatoria (Balón, 1986) describe los cambios y procesos del desarrollo a través de su historia de vida, los cuales son a partir de “pasos” que son intervalos estables de la ontogenia y cómo estos procesos suceden en relación con su ambiente. Los pasos están separados por umbrales, que son cambios cuantitativos que se suman en cambios cualitativos sincrónicos y que en conjunto, dan lugar a cambios funcionales abruptos en la ontogenia; éstos darán lugar a una nueva relación ambiental y posteriormente, a un nuevo paso en el desarrollo (Balon, 1985; Hernández-Rubio, 2009). Estos cambios en la estructura y la función de un organismo se acumulan hasta que se encuentran las restricciones de desarrollo.

Balón (1985) ha desarrollado un modelo de ontogenia de la historia de la vida en peces como representación jerárquica del desarrollo. En este modelo, el término "etapa" se usa para describir un estado instantáneo de la ontogenia, mientras que los términos 'paso', 'fase' y 'período' se refieren a intervalos ontogénicos durante el desarrollo (Balón 1985). Los cambios en varios parámetros durante los umbrales menos estables en la historia de vida puede resultar en la bifurcación de la evolución durante la ontogenia (Balón, 1990). Un conocimiento detallado de las diferencias intra e interespecíficas en ontogenia puede orientarnos a realizar inferencias sobre barreras de aislamiento reproductivo y los mecanismos responsables de la divergencia filogenética de nuevas especies (Oster & Alberch, 1982). El ciclo de la vida en los peces se explica con base en sus características fisiológicas y morfológicas dado que presentan cambios que describen pasos, fases, etapas o periodos del desarrollo. En general los periodos del embrión, larva, juvenil y adulto pueden englobar cada aspecto de su ontogenia y como están estrechamente relacionados con su hábitat (Macpherson, 1998; Alarcón et al. 2017).

Conservación *in situ* y *ex situ*

La conservación de flora y fauna se desarrolla de dos maneras básicas: una dentro del hábitat natural de las especies o conservación *in situ* y la segunda es fuera del hábitat, es decir conservación *ex situ*. Los zoológicos, museos, colecciones, jardines botánicos y acuarios o prácticas acuícolas, representan centros clave para la conservación de la biodiversidad (Gutiérrez Guerrero, 2014).

Genética de la conservación

Sir Otto Frankel (1900-1998) fue el que reconoció los factores genéticos en la biología de la conservación (Frankham, 1995). Sin embargo, el nacimiento de esta subdisciplina se circunscribe a la década de 1970 (Frankel 1970 y 1974). En 1980, Michael Soulé tuvo una

profunda influencia en el desarrollo de la biología de la conservación como tarea multidisciplinaria. Existen siete preocupaciones genéticas en la biología de la conservación: (a) depresión por endogamia, (b) acumulación y pérdida de mutaciones deletéreas, (c) pérdida de variación genética en pequeñas poblaciones, (d) adaptación genética al cautiverio y su efecto en el éxito de la reintroducción, (e) depresión de la exogamia, (f) fragmentación de las poblaciones y reducción de la migración, e (g) incertidumbres taxonómicas y la introgresión. El desafío de la biología de la conservación es aumentar el conocimiento de las complejas redes causas-efectos (tamaño poblacional, variación genética, servicios ecosistémicos y probabilidad de extinciones locales en las poblaciones) para poder prevenir el daño y el deterioro a las especies (Frankham, 1995).

Herencia genética y Principio Hardy-Weinberg

Entre 1856 y 1863, el monje agustino Gregor Mendel realizó experimentos con plantas de guisantes. Mendel demostró que los fenotipos son determinados por unidades discretas que se heredan intactas y sin cambios a través de las generaciones. Su hipótesis fue suficiente para explicar tres observaciones comunes: (i) el fenotipo algunas veces es idéntico entre los padres y la descendencia; (ii) el fenotipo de la descendencia puede diferir de la de los padres; y (iii) fenotipos “puros” de generaciones ancestrales podrían saltar generaciones y reaparecer en generaciones posteriores. Fue Mendel quien estableció la primera y la predicción más fundamental de la genética de poblaciones: Frecuencias esperadas del genotipo y postuló las llamadas “Leyes Mendelianas” en donde la primera Ley de Mendel predice una segregación de alelos independiente en un solo *locus*: dos miembros de un par de genes (alelos) segregan por separado en los gametos ya que la mitad de los gametos llevan un alelo y la otra mitad llevan el otro alelo. La segunda Ley de Mendel predice la herencia independiente de múltiple *loci*: Durante la formación de gametos, la segregación de alelos de un gen es independiente de la segregación de alelos de otro gen. Mendel concluyó que la

proporción de una segregación fenotípica es de 9:3:3:1 y es la misma que la combinación de dos fenotipos independientes 3:1; $3:1 \times 3:1 = 9:3:3:1$ (Hamilton, 2009).

El principio de Hardy-Weinberg es un modelo nulo en sistemas diploides que segregan de manera Mendeliana y se reproducen sexualmente. Emplea los fundamentos de la probabilidad permitiéndonos entender la genética de las poblaciones a través de los cambios en las frecuencias alélicas, genotípicas y los mecanismos evolutivos que actúan en una población (Hamilton 2009). El principio se describe como la distribución de las frecuencias genotípicas en una población en función de las frecuencias alélicas. Este modelo nulo asume que en una población ideal las frecuencias alélicas no cambian, si cumplen cuatro condiciones: 1) El tamaño poblacional es infinitamente grande; 2) Los apareamientos son azarosos; 3) Todos los alelos tienen la misma probabilidad de heredarse; 4) No hay flujo génico por lo que no se incorporan genes nuevos a la poza génica; 5) no hay mutaciones (Hedrick, 2005).

En organismos diploides cada gen tiene dos copias: una que proviene de la hembra y la otra del macho. En el modelo, para cada gen existen dos alelos (A y a) mientras que el gen particular se le denomina *locus* (Eguiarte, 1986). Bajo este modelo después de una generación con apareamiento al azar, las frecuencias genotípicas esperadas bajo el equilibrio de Hardy-Weinberg serán:

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

Donde AA son los individuos con el genotipo homocígo dominante (D). Los individuos Aa representan al genotipo heterocígo (H), y los individuos aa presentan el genotipo homocígo recesivo (R). La suma de los tres genotipos es el número total de individuos en la población (N), con los cuales se pueden calcular las frecuencias genotípicas:

$$D = N_{AA} \quad H = N_{Aa} \quad R = N_{aa}$$

Una vez obtenidas las frecuencias genotípicas, se calculan las frecuencias alélicas; la proporción total del alelo A ($f(A)$ o frecuencia alélica “ p ”) y la proporción total del alelo a ($f(a)$ o frecuencia alélica “ q ”) con la siguiente formula:

$$F(A)=p=D+ \frac{1}{2} H \quad f(a)=q= R+ \frac{1}{2} H \quad p+q=1$$

A partir de cualquier frecuencia genotípica inicial (D, H, R) en la siguiente generación se dará la relación:

$$D=p^2; H=2pq; R=q^2$$

$$(p^2+2pq+q^2=1)$$

Por lo tanto, en una población ideal, en donde se cumplen las cinco condiciones, ninguna fuerza evolutiva esta actuando, es decir, la población esta bajo el Equilibrio de Hardy-Weinberg. Generalmente no se cumplen estas condiciones de una población ideal, debido a la dinámica historia evolutiva y demográfica de las poblaciones (Hamilton, 2009; Hedrick, 2005).

Variación Genética

La diversidad genética se refiere a la variedad de alelos, genotipos y fenotipos presentes en cierta especie (Hedrick, 2005; Hamilton, 2009). La diversidad genética es necesaria para que las poblaciones se adapten a cambios en el medio ambiente. Esta diversidad se ve reflejada en la morfología, el color, las conductas y es resultado de la variación en las secuencias de DNA y los efectos ambientales. En algunas poblaciones silvestres las especies suelen tener una amplia diversidad genética, pero por lo general es reducido en especies en peligro de extinción (Frankham, 2004; Frankham et al., 2009). En algunos casos se ha optado por resguardar poblaciones naturales que se encuentran vulnerables o en peligro de extinción, manteniéndolas en cautiverio (Frankham et al., 2009). Sin embargo, un problema recurrente en el establecimiento de las poblaciones en cautiverio es el número de individuos fundadores con los que se inicia la población. Se estima que se requieren un mínimo de 30 a 40 individuos fundadores para tener una muestra representativa de

la variación genética que se encuentra de manera silvestre (Frankham et al., 2009; Gutiérrez Guerrero, 2014). La variación genética es la fuente promotora de la evolución de las especies, la evolución no puede ocurrir si no hay diversidad genética, la supervivencia de las especies depende en gran medida de su variación genética (Frankham et al., 2009). Ésta se puede cuantificar evaluando los diferentes haplotipos y genotipos y es normalmente descrita usando estimadores como son la riqueza alélica, sitio polimórfico o segregante, heterocigosis esperada y la diversidad haplotípica (Gillespie, 2004). Conocer esta variación genética permite determinar las relaciones evolutivas y ecológicas entre las poblaciones (Templeton, 1998). Varios factores determinan la cantidad y el tipo de variación genética en las poblaciones, entre ellos juegan un papel fundamental las fuerzas evolutivas. Éstas tienen diferentes efectos sobre la variación genética: la mutación aumenta la variación, la deriva génica y la endogamia la disminuyen, la selección pueden aumentarla o disminuirla según el contexto y el flujo génico homogeniza la variación y tiende a mantenerla en las poblaciones al contrarrestar los efectos de la deriva génica (Hedrick, 2005).

Fuerzas evolutivas

Las fuerzas evolutivas (mutación, flujo de genes, selección natural, deriva génica y endogamia) afectan las frecuencias alélicas dentro y entre poblaciones de una especie. Estos cambios juegan un papel importante en la diversidad genética; se dan a través del tiempo generacional y permiten determinar si está actuando la evolución en cierta población (Hedrick, 2005).

Mutación

La mutación es el proceso de origen de la variación genética. La tasa a la que ocurre es muy baja y varía dependiendo de cada especie y de la región del genoma que se esté analizando. En la naturaleza las tasas de mutación son muy bajas, de 10^{-5} a 10^{-8} , por lo tanto, es un proceso lento que requiere miles de generaciones para observar un cambio en las frecuencias alélicas (Eguiarte,

2009). La tasa de mutación es relativamente constante a través del tiempo sin embargo puede ser distinta para diferentes genes, diferentes regiones del genoma o diferentes organismos. La mayoría de las mutaciones son selectivamente neutras, y están sujetas a la acción de la deriva génica. En algunos casos las mutaciones pueden estar sujetas a selección y ser deletéreas, es decir que tendrán un efecto negativo en el organismo y en otras ocasiones son ventajosas incrementando la sobrevivencia y fecundidad de los organismos (Hedrick, 2005).

Selección natural

La selección natural es un mecanismo evolutivo que genera un cambio en las frecuencias relativas de los fenotipos/genotipos, de acuerdo a su adecuación dentro de la población (Hedrick, 2005). Durante mucho tiempo se creyó que la selección era la principal fuerza que mantenía la variación fenotípica y genotípica (Castillo-Cobián, 2007; Futuyma, 1986; Li, 1997). Estas ideas terminaron con la propuesta de la teoría neutra de la evolución (Kimura, 1968, 1983). Básicamente, la selección natural a nivel molecular puede ser considerada de dos tipos: selección positiva (que incluye a la selección balanceadora o diversificadora, y a la adaptativa darwiniana) y selección negativa (Castillo-Cobián, 2007; Li, 1997). En la selección positiva, ciertos alelos tienen ventaja en el ambiente, un alelo siempre será el dominante y éste se fijará en la población, e incrementará su adecuación o *fitness* (capacidad de supervivencia y reproducción para heredar sus genes). Sin embargo, como un alelo se fijará y el otro se pierde, se reduce la variación en la población. La ventaja del heterocigoto ocurre cuando el heterocigoto tiene una adecuación mayor y se ve favorecido este genotipo, y los dos homocigotos se mantienen en la población. Esto promueve que se mantenga la variación genética. Por lo general se llega a un equilibrio en las frecuencias alélicas (Hedrick, 2005). La selección negativa sucede cuando los nuevos mutantes poseen adecuaciones menores que el promedio de la población, y la frecuencia de estos disminuye en las siguientes generaciones (Castillo-Cobián, 2007; Li, 1997).

Selección artificial y proceso de domesticación

Charles Darwin acuñó el término “selección artificial” en su libro *El origen de las especies* (1859) y amplió aún más este concepto en: *La variación de animales y plantas domesticados* (1882). Sin embargo, su concepto de selección inconsciente era algo diferente de lo que este término significa hoy en día. Como argumentó Rindos (1984), la selección inconsciente de Darwin significó en primer lugar la falta de intención del domesticador de alterar la raza. Sin embargo, Darwin no explicó cómo funciona esta selección, y no consideró el impacto de los cambios ecológicos (Zohary, 2004). El término domesticación proviene del latín *domus* que significa “hogar” o “lugar de habitación”, el cual hace referencia al hecho de traer una población silvestre, o población fundadora, cerca del lugar de habitación del hombre (Zohary, 2004).

Dos tipos de selección asociados con la domesticación operan (y se complementan entre sí) cuando las poblaciones silvestres se introducen al cautiverio: 1) La selección consciente o intencional, que sucede cuando los cultivadores intencionalmente preservan a los que consideran los caracteres más valorados, y los usan para generar la próxima generación y 2) selección inconsciente o automática, la cual es provocada involuntariamente por el hecho de que los organismos en cuestión fueron trasladados de sus hábitats silvestres originales a nuevos entornos (y con frecuencia muy diferentes) creados por el ser humano. Este cambio en la ecología conduce automáticamente a cambios drásticos en las presiones de selección. Los nuevos rasgos se seleccionaron automáticamente para adaptarse a los nuevos ambientes, lo que resultó en la acumulación del característico "síndrome de domesticación" (Zohary, 2004).

El proceso de domesticación también se puede considerar como un proceso evolutivo unidireccional, en el cual las poblaciones experimentan cambios genéticos y fenotípicos debido a la selección artificial del humano. La selección artificial de la población domesticada promoverá que se reduzca la variación genética total presente en el progenitor silvestre (Doebly, 1992; Doebly et

al., 2006). Durante la domesticación se provoca un cuello de botella genético a nivel poblacional, y la diferenciación de un nuevo linaje a un nivel genealógico. A partir de este momento las diferentes poblaciones o linajes comenzarán a acumular mutaciones de forma independiente. El aislamiento geográfico y la adaptación a las nuevas condiciones ambientales pueden ser otros factores adicionales que conducen a la diferenciación poblacional (Sonnante et al., 1994).

Deriva génica

La deriva génica reduce la variabilidad genética dentro de la población y con el tiempo los miembros de la población pueden llegar a ser genéticamente idénticos al fijarse alelos aleatoriamente. Es decir, los alelos presentes en un momento dado en una población de individuos diploides son sólo una muestra de los alelos presentes en la generación previa, ya que algunos de ellos no fueron transmitidos a la siguiente generación. En una población finita, un alelo que deje por azar más descendencia aumentará su frecuencia en la población (Futuyma, 1986).

En las poblaciones pequeñas, cuando la población crece a partir de unos cuantos fundadores, se reduce la variación genética con respecto a la población original debido a la deriva génica, a este efecto se le denomina efecto fundador. Cuando una población desciende solo de un número pequeño de individuos, causada por un efecto fundador o un cuello de botella, estos cambios afectan la variación genética y las frecuencias alélicas dando como resultado un decaimiento en la heterocigosis de la población y disminución en la variación genética. El efecto de la deriva génica es más severo en poblaciones pequeñas. Con el paso del tiempo, las siguientes generaciones presentarán cada vez menos copias de los alelos originales y se incrementará la frecuencia de individuos homocigos, aumentando también la probabilidad de que sus alelos sean idénticos por ancestría. La deriva génica esta asociada a eventos demográficos como: cuello de botella y el efecto fundador (Hedrick, 2005).

Endogamia

En poblaciones pequeñas o en cautiverio los apareamientos entre parientes o consanguíneos (endogamia) son un tanto inevitable y en la mayoría de los casos son consecuencia de la pequeña cantidad de fundadores y del pequeño tamaño poblacional. La frecuencia de heterocigotos se reduce, y la de homocigotos aumenta, en relación con las expectativas de Hardy-Weinberg. La endogamia es sumamente importante en la biología de la conservación, ya que conduce a reducciones en la heterocigosidad, lo cual puede resultar en una disminución en la adecuación o *fitness*, que se refleja en la reducida tasa de reproducción y supervivencia, a la pérdida de variación genética y al aumento del riesgo de extinción. A esta pérdida de la aptitud reproductiva como consecuencia de la endogamia se le denomina depresión por endogamia (Frankham, 2004). Cuando se llevan a cabo programas de selección de crías (Ej. En camarón, salmón u otras especies con alta fecundidad y de importancia acuícola) es importante contar con información sobre las relaciones genealógicas o pedigrís entre individuos a lo largo de múltiples generaciones. Esto permite el diseño de programas de cría que maximizan la plasticidad para rasgos como el crecimiento y al mismo tiempo minimiza el potencial efecto perjudicial de los apareamientos consanguíneos (Jerry et al. 2004). Los efectos del apareamiento consanguíneo también pueden ser descritos como aumentar la probabilidad de que dos alelos en un *locus* en un individuo se heredan del mismo antepasado. Es decir, que sean idénticos por ancestría (IBD). Tal genotipo lo haría ser homocigoto y considerado autocigoto ya que los alelos fueron heredados de un ancestro común y se expresa comúnmente como el grado de parentesco entre familiares (Hamilton, 2009). La probabilidad de que los alelos en un *locus* sean idénticos por descendencia se denomina coeficiente de endogamia (F_{IS}) el cual mide la reducción en la heterocigosis de un individuo debido al apareamiento no azaroso dentro de su subpoblación, es decir, es la probabilidad de que un individuo reciba en un *locus* dado, dos alelos que sean Idénticos Por Descendencia (IBD). Este indicador refleja el nivel

de endogamia. Los valores de F_{IS} pueden variar desde -1 (exceso de heterocigotos), 0 (distribución azarosa) hasta +1 (exceso de homocigotos) (Frankham, 2004; Hedrick, 2005; Eguiluz Moya, 2014).

F_{IT} es denominado como coeficiente de endogamia total de un individuo, al ser comparado con los valores de F_{IS} y F_{ST} nos da una idea de la diferenciación entre poblaciones relacionados con la endogamia y la deriva génica (Hartl y Clark, 1997). Presenta valores que van de -1 a 1, donde los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos y los valores negativos un exceso de heterocigotos (Hedrick, 2000). F_{IS} y F_{ST} han sido llamados índices de fijación y sus valores pueden interpretarse como la desviación de las frecuencias genotípicas esperadas en el equilibrio de Hardy-Weinberg dentro de las poblaciones locales y la población total (Avice, 1994).

Flujo Génico

En muchas ocasiones las poblaciones se encuentran subdivididas, sin embargo, pueden estar conectadas entre sí por medio de flujo génico (Hedrick, 2005). El flujo génico se refiere a todos los mecanismos que generan movimiento de genes de una población a otra. Se calcula indirectamente a partir de medidas de diferenciación genética o a partir de métodos coalescentes. Cuando el flujo génico entre las poblaciones es alto, las subpoblaciones se homogenizan genéticamente, es decir todas ellas evolucionan de manera conjunta. Cuando encontramos un flujo génico bajo por la presencia de una barrera geográfica o ecológica o por fragmentación del área, la deriva génica va a influir y promover diferenciación genética entre las subpoblaciones, las cuales empezarán a divergir, lo que puede contribuir al aislamiento reproductivo y al establecimiento de linajes evolutivamente independientes (Aguirre-Planter, 2007; Slatkin, 1994).

En las poblaciones es importante estimar la estructura poblacional y se utilizan los estadísticos F , introducidos por Wright (1951). Estos describen la estructura génica de organismos diploides, utilizando la varianza en las frecuencias alélicas obtenidas de diferentes localidades geográficas para cuantificar la subdivisión de la población o para estimar el flujo génico entre poblaciones.

(Wright, 1951). F_{ST} , conocido como índice de fijación subpoblacional, mide la diferenciación genética entre las poblaciones dado por la presencia de estructura genética. Los valores de F_{ST} van desde 0, cuando no hay diferenciación entre las poblaciones, hasta 1, cuando se han fijado los diferentes alelos en las subpoblaciones (Hartl y Clark, 1997; Wright, 1969).

Cuello de botella y efecto fundador

En poblaciones que han experimentado una reducción de su tamaño efectivo poblacional debido a procesos demográficos, fragmentación del hábitat o como consecuencia de una extinción local, solo un pequeño número de individuos que sobreviven a esta reducción serán los que aportarán genes a la población total, a esto se le denomina un evento de cuello de botella, ya que la población presentará cambios en las frecuencias alélicas, reducción en la diversidad genética y la fijación de alelos, por consecuencia exhiben una reducción en el número de alelos y la heterocigosidad en *loci* polimórficos (Cornuet, 1996).

El efecto fundador ocurre cuando un número de organismos (generalmente con tamaño poblacional pequeño) funda colonias aisladas, es decir, establece una nueva población. Tomar una pequeña muestra de la composición genética de la población original puede ocasionar que cambien azarosamente las frecuencias alélicas y con ello se produzcan cambios en las frecuencias genotípicas (Hamilton, 2009).

Teoría neutral de la evolución molecular

La teoría neutra de la evolución molecular de Kimura (1968), postula que la mayor parte de la variación molecular no es mantenida por la selección tipo Darwiniana (selección adaptativa o positiva), sino que es el resultado de un balance entre la deriva génica y la mutación (Castillo-Cobán, 2007; Kimura, 1983; Ohta, 1992). Es un modelo teórico nulo (Hamilton, 2009) que permite hacer predicciones acerca de la homocigosis esperada bajo ciertos modelos de evolución

molecular (Hartl y Clark 1997). El modelo nulo de la teoría neutral hace dos predicciones importantes bajo el supuesto de que la deriva genética por sí sola determina el destino de las nuevas mutaciones. Una predicción es la cantidad de polimorfismo para las secuencias de la muestra dentro de una población de una especie. La otra predicción es el grado y la tasa de divergencia entre las secuencias de la muestra a partir de especies distintas (Hamilton, 2009).

Marcadores moleculares

En el presente trabajo se utilizaron como marcadores moleculares, los microsatélites (conocidos como SSRs, o STRs), los cuales han sido muy populares desde su descubrimiento en la década de 1980 (Tautz y Renz 1984), se han convertido en el marcador de elección para una variedad de estudios ecológicos y evolutivos a nivel de población (Gardner et al. 2011; Sunnucks 2000). Gracias a su elevada tasa de mutación suelen ser altamente polimórficos y generan mucha información especialmente para ciertas aplicaciones de la biología evolutiva, como lo es detectar estructura en las poblaciones, así como divergencias recientes, facilidad de genotipificación, huellas genéticas, análisis de parentesco, mapeo genético (Ellegren, 2004) entre otras. Se ha estimado que su tasa de mutación varía entre 10^{-2} y 10^{-6} por locus por generación y es en promedio de 5×10^{-4} (Schlötterer, 2000), haciéndolos útiles para estudios microevolutivos (Hancock, 1999).

Son marcadores codominantes que presentan herencia mendeliana, consisten en secuencias cortas (de 1 a 6 pb nucleotídicas) repetidas en tándem un alto número de veces (Hancock, 1999), flanqueadas por secuencias conservadas, las cuales confieren especificidad en cada locus microsatelital. Son muy abundantes en el genoma nuclear de todos los eucariotas, en algunos genomas mitocondriales de vertebrados (Hoelzel et al., 1993), procariotas y en los genomas de los cloroplastos de las plantas (McCauley, 1995).

Justificación

En los últimos años, las poblaciones de *Chirostoma humboldtianum* han sido afectadas por diversos factores antropogénicos, como son: la contaminación del agua, la alteración o destrucción de sus sitios de distribución, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación pesquera y el manejo inadecuado. En la actualidad, sus poblaciones no alcanzan su tamaño máximo original y, en algunas regiones han sido extirpadas, como en el Valle de México (Paulo-Maya et al., 2000). En el presente trabajo se realizarán cruces de organismos de dos poblaciones que presentan características morfológicas y genéticas contrastantes, con la finalidad de obtener una progenie con mayor variación genética y mayor talla (debido a la importancia económica y pesquera de la especie). La población de Tiacaque, Estado de México, presenta una mayor talla y fecundidad (Tabla 3) con respecto a Tepuxtepec, Michoacán, la cual presenta mayor diversidad genética mitocondrial y nuclear.

Tabla 3. Tabla comparativa de las poblaciones de *Chirostoma humboldtianum*. *H*=haplotipos, *Hd*= diversidad haplotípica en mitocondria (Citocromo b), *Ho*= Heterocigosis Observada con microsatélites. (Alarcón et al. 2017; García Martínez, 2015)

Tepuxtepec, Michoacán		Tiacaque, Estado de México
8 cm -16.6 cm (Talla)	<	5.7 cm -19 cm
Fecundidad (No. De huevos)	<	Fecundidad
$H = 10$; $Hd = 0.862$ (Citb)	>	$H=1$; $Hd = 0$ (Citb)
$Ho = 0.45$ (Microsatélites)	>	$Ho = 0.33$

Pregunta de investigación

Dado que las poblaciones de *Chirostoma humboldtianum*, muestran un alto grado de estructura genética, cabe preguntar si ¿al cruzar estas dos poblaciones, se presentará progenie viable? Así como sí, ¿las nuevas generaciones presentarán vigor híbrido ó heterosis, es decir, los fenotipos deseados, tendrán un incremento en la talla y en la variación genética?

Hipótesis

- *Ho*. La cruce de las poblaciones no presentará una F1 viable y por lo tanto no producirá diferencias significativas en la talla y variación genética entre las cruces de las poblaciones de Tiacaque y Tepuxtepec.
- *Ha*. La progenie resultante del cruzamiento de dos poblaciones en cautiverio de *Chirostoma humboldtianum* será viable y la F1 presentará vigor híbrido ó heterosis.

Objetivos

Objetivo general

Determinar la viabilidad y la diversidad fenotípica y genética, de la progenie de dos poblaciones de *Chirostoma humboldtianum*, Tiacaque Estado de México y Tepuxtepec, Michoacán, que muestran características morfológicas y genéticas contrastantes.

Objetivos particulares

1. Determinar la existencia de mecanismos de aislamiento reproductivo (pre y postcigótico) en la F1 durante el período embrionario a partir de las fertilizaciones *in vitro* realizadas.
2. Caracterizar genéticamente organismos de dos poblaciones silvestres y reproductores y F1 en cautiverio con marcadores microsatelitales.
3. Comparar y relacionar la diversidad genética de la F1 y reproductores con respecto a las poblaciones silvestres.
4. Elaborar análisis de parentesco para la F1 y la población cautiva.
5. Proponer estrategias de manejo y de conservación de esta especie.

Métodos

Cruzas de reproductores y generación F1

Con base en el objetivo 1, se seleccionaron los adultos reproductores de *Chiriotoma humboldtianum* de las poblaciones de Tiacaque y Tepuxtepec, los cuales se encuentran en cautiverio en la Planta Experimental de Producción Acuícola (PEXPA). El diseño experimental se llevó a cabo mediante fertilizaciones *in vitro* a través de la extracción de los óvulos y el semen, ejerciendo presión en dirección antero-posterior desde la parte ventral hacia la cloaca (Figura 3). Se realizó la fertilización *in vitro* del cruzamiento de las poblaciones en cautiverio de Tiacaque y Tepuxtepec. Por medio de un microscopio óptico y del micrómetro ocular se cuantifico el diámetro y el tamaño de la larva con una amplificación de 10x y se documentaron los diferentes cambios durante el desarrollo embrionario hasta la etapa juvenil en la progenie obtenida. Se realizaron dos cruzas independientes, la primera fue una cruce 2:1, dos hembras de la población de Tepuxtepec y un macho de la población de Tiacaque; la segunda fue 2:3, dos hembras de Tiacaque y tres machos de Tepuxtepec. Debido a los pocos reproductores que se encontraban en ese momento en los estanques 6 y 8 (Tiacaque y Tepuxtepec, respectivamente), ya que las hembras presentan gónadas asincrónicas y algunos individuos se encontraron indiferenciados. Los gametos se mezclaron en cajas de Petri con agua de los estanques. Se corroboró que el óvulo fuera fecundado con la formación del espacio previtelino, por medio de observaciones en los microscopios estereoscópico y óptico. Los huevos se colocaron en vasos de precipitado de 1 L. Al momento de la eclosión, las larvas se mantuvieron en un recipiente de 4 L hasta el periodo de eleuteroembrion y durante el periodo juvenil se trasladaron a las canaletas de aproximadamente 100 L. Cada tercer día se realizaron recambios de agua; a lo largo del experimento se mantuvieron los peces en agua

semidura, con 2g/L de sal y una aireación constante, en temperatura ambiente que osciló entre 19-24 °C, y oxígeno disuelto de 4.05 mg/L.

Con el inicio de la alimentación mixta, los eleuteroembriones se alimentaron con rotíferos *Brachionus plicatilis*, en las fases de apterolarava y pterolarva su alimentación consistió en naupilos de *Artemia salina*, ya que en este momento inicia una alimentación de tipo exógena, cuando el aparato enzimático es funcional. Posteriormente durante el crecimiento de las larvas, éstas se alimentaron con pulgas de agua del género *Daphnia* hasta la fase juvenil. Los adultos reproductores son alimentados con alimento balanceado para trucha (25 % proteína).

Se cuantificó el porcentaje de fertilización y sobrevivencia y se dio seguimiento a la F1 durante su desarrollo temprano, desde el momento de la activación del huevo hasta la metamorfosis a juvenil, observando los cambios en los diferentes fases, así como las tasas de mortalidad.

Figura 3. Extracción de óvulos y semen para realizar la fertilización in vitro.

Análisis de Sobrevivencia y Morfológicos

Sobrevivencia, longitud y peso

Se cuantificó el porcentaje de sobrevivencia en las dos cruzas desde la fertilización del huevo hasta el periodo juvenil, tomando como 100 % únicamente los huevos que fueron fertilizados desde

el día uno. El análisis morfológico, consistió del registro de la longitud notocordal o total y el peso de los individuos, las cuales son medidas que permiten analizar cambios que ha presentado una población (Frankham, 2008). Los organismos se pesaron y se midieron, registrando el peso en mg (P) utilizando una balanza analítica, la longitud notocrodal (LC), se registró tomando la distancia de la punta de la boca a la región pedúnculo caudal, la longitud total (LT), fue cuantificada en milímetros, tomando nuevamente la distancia de la punta de la boca a la región más externa de la aleta caudal, utilizando un vernier. Los peces fueron fijados en alcohol 85 % para realizar posteriormente la extracción de ADN.

Los análisis de los datos morfológicos fueron graficados empleando el programa estadístico R studio y con el programa NCSS v12, se realizó una prueba estadística *t-Student* para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre la F1 resultante de las dos cruzas.

Extracción de ADN total (ADNt) de reproductores y F1

La extracción de ADNt de cada muestra, se realizó tomando aproximadamente 1 cm² de tejido de músculo de la zona ventral de cada pez y siguiendo el protocolo de Kit Promega Wizard® Genomic DNA Purification Kit. (Apéndice I). Los productos de extracción se cuantificaron (ng/μL) en el nanodrop (Thermo Scientific), adicionalmente se corroboró la extracción de ADN en una electroforesis en gel de agarosa al 1.5% al cual se le añadió 0.2 μL de Gelred (Biotium), la cual es una tinción de ácido nucleico intercalante, que consta de dos subunidades de etidio y nos permite visualizar los productos de ADN una vez teñidos, posteriormente se visualizó en un fotodocumentador Multigenius trasiluminador de luz UV y con el programa Gene Snap v. 6.02.05 fue capturada la imagen de la electroforesis.

Genotipificación de poblaciones silvestres, reproductores y F1

Con la finalidad de conocer la diversidad genética de las poblaciones silvestres de la especie de estudio y contrastarla con la de los progenitores y progenie (F1), se realizó la genotipificación de individuos de las poblaciones de las presas “Tepuxtepec”, Michoacán, México, y “Las Tazas”, Tiacaque, Estado de México, se utilizó ADNt extraído por García-Martínez et al. (2014), correspondiente a 48 individuos de cada una de las poblaciones, contando así con un total de 96 individuos silvestres. Asimismo se analizaron progenitores y progenie (Tabla 4).

*Tabla 4. Poblaciones e individuos analizadas de *Chirostoma humboldtianum* en el presente estudio.*

Localidad	Estado	Clave	N	Altitud	Coordenadas	Colecta (año)
Presa Tiacaque	Edo. de México	T	48	2540	19° 38'29"N- 99° 42'27"O	2002
Presa Tepuxtepec	Michoacán	Tx	48	2361	19°59'42"N- 100°13'33"O	2010
Reproductores	PExPA	RT, RTx	8	2250	19°21'41"N -99°04'22"O	2017
F1	PExPA	PT, PTx	67	2250	19°21'41"N -99°04'22"O	2018

Para realizar la genotipificación de los 171 individuos que representan a las dos poblaciones silvestres, los reproductores y la F1, se realizó la estandarización de las condiciones para la amplificación de ocho *loci* microsatélites por medio la técnica de PCR de acuerdo con Barriga-Sosa et al. (2014) y resueltos como los más polimórficos para la especie. Las condiciones de PCR estandarizadas se resumen en la Tabla 5 y las condiciones térmicas se muestran en la Tabla 6. Las características de los ocho *loci* microsatélites estandarizados se muestran en la Tabla 7, las amplificaciones se realizaron en un termociclador Biorad MyCycler (USA). La visualización de la amplificación y la calidad se comprobaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1.5 y fueron posteriormente genotipificados por MACROGEN Inc. (www.macrogenusa.com) a partir de 8 uL del producto de PCR. El tamaño de los alelos fue determinado usando LIZ-500 como marcador de tamaño estándar (Applied Biosystems).

Tabla 5. Concentraciones de los reactivos utilizados para la amplificación de ocho loci microsatelitales por medio de PCR.

Reactivos	[] inicial	[] final	Volumen inicial
Amortiguador	5x	1x	1 µL
MgCl ₂	25 mM	2.5 mM	0.4 µL
dNTP's	10 mM	0.2 mM	1 µL
Primer Foward	10 mM	0.2 mM	0.2 µL
Primer Reverse	10 mM	0.2 mM	0.2 µL
Taq	5 U	0.25 U	0.1 µL
ADN			1 µL
H ₂ O			6.1 µL
Total			10 µL

Tabla 6. Programa del termociclador para la amplificación de diferentes loci por medio de PCR.

	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización	95 °C	5 min	
Desnaturalización	94 °C	30 s	
Alineación	*52-62 °C	30 s	X 35
Extensión	72 °C	40 s	
Extensión final	72 °C	15 min	

* Diferentes temperaturas de alineación para cada microsatélite que se muestran en la tabla 6.

Tabla 7. Nombre, secuencias de los iniciadores, características y temperatura de alineación para cada uno de los ocho loci microsatelitales estandarizados (Barriga-Sosa et al., 2014).

<i>Chirostoma humboldtianum</i>					
Locus	Secuencia Primer	SSR motif	Temperatura de alineación	Tamaño alelo esperado	Cromatóforo
Chum12	F: TGACCCCGGATAAACTGTGG R: CATGAGGATTCCAAGGGC	(ATGG)44 (ATGG)44	60	125 - 185	VIC
Chum14	F:TCATTGTCTAGTGTGTATGTGCG R: TAAACTGTGGGAAAGGGC	(AC)42 (AC)42	54	118 -188	FAM
Chum44	F:AGGGAGGTCTGAAGTCGTGC R: TTGTTGCCAAACGTTCTGAGG	(AAAG)48	55	160 - 270	VIC
Chum55	F: AGGGCAGCGCATTTTACG R: AGAGTGCTCAGAGGCAAAGG	(AAAG)24	57	322 -354	VIC
Chum58	F:CAGAGGAAACGGAGAGAGTTGTAGC R: CAGCGAAAACAGATACATAAAGACC	(ATCT)24	58	253 – 363	FAM
Chum60	F:ATGTTCTTGACACCAACGACCC R: ATGTTCTTGACACCAACGACCC	(ATGG)28	53	265 - 301	FAM
Chum62	F: TTCCAAGGCTTCATTGTAAGG R: CGACAGGAAAGTGGAAGG	(AAAG)28	53.5	289- 361	FAM
Chum69	F: GCATGAAGCAGAACATTAACCC R: CAGAGTTCAGTCAAAGGAGAGC	(AAAT)40	53.5	206- 310	FAM

Análisis Genéticos

Tamaño alélico y Alelos nulos

Para cuantificar los tamaños de alelos de cada individuo, se utilizó el programa Peak Scanner V. 1.0. (Applied Biosystems, 2005). El cual permite distinguir fragmentos pequeños y grandes de ácidos nucleicos del producto de PCR empleando un marcador que indique el peso molecular en pares de bases (LIZ-500). Dado que los microsatélites son marcadores codominantes, la presencia de un solo pico indica que para ese locus el individuo es homocigoto y si se detectan dos picos el individuo para ese locus es heterocigoto. Cabe mencionar que se observaron algunos individuos tetraploides en la cruce de Tepuxtepec, por lo que se tomaron los picos mas externos como tamaños alelicos, ya que el programa es para organismos diploides.

Para identificar errores en la genotipación por alelos no amplificados (alelos nulos), todos los *loci* fueron analizados en el programa Micro-Checker v. 2.2.3 (Van Oosterhout et al. 2004), en el cual se puede detectar la discriminación de alelos en los *loci* debido al efecto Wahlund, endogamia y desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg causado por alelos nulos. Esta aproximación permite determinar el sesgo por la presencia de alelos nulos en la estimación de la estructura genética de las poblaciones. Adicionalmente con el software FreeNA (Chapuis y Estoup, 2007) se corrió un análisis que permite determinar el sesgo introducido por la presencia de alelos nulos en las muestras ya que estima la frecuencia de alelos nulos para cada locus y calcula la estructura genética a partir de la F_{ST} de Weir & Cockerham (1984), realiza un ajuste de las frecuencias genotípicas y calcula la distancia genética empleando una corrección para microsatélites nulos (Chapuis y Estoup, 2007).

Variación genética, pruebas del equilibrio de Hardy-Weinberg, de ligamiento y AMOVA

Para realizar los análisis de variación genética se utilizó el programa Genepop v. 4.0 (Rousset,

2007), determinando los siguientes parámetros: número de alelos por locus (NA), frecuencias alélicas y genotípicas, frecuencia de Homocigóticos observados y esperados, Heterocigóticos observados (H_O) y esperados (H_E). Se corroboraron los resultados con el programa Arlequin v. 3.5 (Excoffier y Lischer, 2010), se realizó una prueba de desequilibrio de ligamiento para detectar recombinación en las muestras, el cual nos permite identificar que tan asociados están los alelos de distintos *loci* en una muestra y verificar que los *loci* empleados sean independientes. Adicionalmente con este mismo programa se realizó una prueba de análisis de varianza molecular (AMOVA), el cual se basa en el análisis directo de las diferencias entre los genotipos para estimar la diferenciación poblacional. Una de sus funciones es analizar la estructura jerárquica de las poblaciones, donde los individuos son agrupados en subpoblaciones y estos en grupos (clusters) de mayor jerarquía (Eguiluz, 2014; Meirmans, 2012). Debido a que esta prueba permite analizar como se reparte la varianza genética entre estos distintos grupos jerárquicos y comparar distintas agrupaciones de estructura para determinar cuál agrupamiento explica mejor nuestros datos. Se realizaron dos análisis independientes; el primero realizando una jerarquía de todos los individuos de las seis poblaciones diferentes, es decir, la primera Tiacaque, seguido de Tepuxtepec, Reproductores de Tiacaque, Reproductores de Tepuxtepec, F1 de T ♀ X Tx ♂, y F1 de Tx ♀ X T♂, y en la segunda se excluyeron los parentales (reproductores) debido a los pocos individuos que lo componen. Con el programa GenoDive se realizó una prueba del equilibrio de Hardy-Weinberg para identificar si alguno de los *loci* presenta desviaciones al equilibrio.

Estructura genética y cuello de botella

La estructura poblacional se refiere a la distribución de la variabilidad genética dentro y entre subpoblaciones locales e individuos dentro de una misma especie (Templeton, 2004). Se utilizó Arlequin v. 3.5 (Excoffier y Lischer, 2010) para estimar la estructura poblacional por medio de los estadísticos F de Wright (1951): F_{ST} , F_{IT} y F_{IS} .

Para evaluar el número de pozas génicas o clusters y la estructura genética en las poblaciones silvestres, así como en los reproductores y en la F1 se corrió un análisis con el programa Structure v 2.3 (Pritchard et al., 2010) el cual emplea un análisis bayesiano y utiliza la distribución de la probabilidad posterior a través de Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC). Se realizaron cuatro corridas de prueba para evaluar el mejor ajuste al modelo, con un modelo de ancestría común y *admixture* (frecuencias alélicas correlacionadas) y *no admixture* (frecuencias alélicas no correlacionadas), explorando el mejor ajuste para las muestras. Se probaron diferentes *K* o *clústers* del uno al seis. Los resultados de las corridas fueron analizados con el programa Structure Harvester (Earl & VonHoldt, 2012) y el valor final de la *K* se determinó a partir del mejor ajuste y convergencia de los datos, así como los valores del logaritmo natural de la probabilidad y su varianza ($\ln$) (Earl & VonHoldt, 2012; Pritchard et al., 2010). Finalmente, confirmando la convergencia de los datos y ajustado el modelo con una ancestría común, se definió un modelo *admixture* y una *K*=3 se realizó una prueba por triplicado y se corrió con un MCMC de 1, 000, 000 de cadenas y un *burn-in* de 100, 000. Con el programa estadístico R se graficó.

Se realizó un análisis exploratorio en las poblaciones con el software Bottleneck v.1.2.02. (Coumuet y Luikart, 1996), el cual compara estadísticamente, por medio de la prueba de Wilcoxon, si existen diferencias significativas entre la heterocigosis esperada del equilibrio, mutación-deriva (H_{Eq}) y la heterocigosis esperada (H_E) y se postula que si existen diferencias significativas entre los valores se podría relacionar con efectos de un cuello de botella en las poblaciones. Este programa asume que existe un equilibrio entre mutación-deriva bajo diferentes modelos de mutación: El Modelo de Alelos Infinitos (IAM: Kimura y Crow, 1964) para aloenzimas, el Modelo *Two-Phase* (TPM: di Rienzo et al., 1994) y el Modelo de Mutación *Stepwise* (SMM: Ohta y Kimura, 1973) para microsatélites, este último modelo ha sido reportado como aquel que se ajusta mejor a los datos microsatelitales (Luikart et al., 1998) con 10, 000 réplicas. Con el programa

GeneClass se realizó una prueba de asignación para cada individuo, es decir, se comprobó la asignación de las poblaciones silvestres, los reproductores, y la F1 a su población de origen.

Análisis de parentesco –Pedigrí–

Para realizar los análisis de parentesco (*pedigrí o studbook*) se emplearon los programas ML-Relate v.1.1 (Kalionowski et al. 2006) y COANCESRY v.1.0.1.2 (Wang, 2008). Estos análisis están basados en la observación de las frecuencias alélicas, ya que a partir de los alelos compartidos entre individuos se realizan simulaciones pareadas para identificar las posibles relaciones de parentesco. El programa ML-Relate calcula a través de las estimaciones de máxima verosimilitud (*maximum likelihood*) las relaciones genealógicas *relatedness* (r) y entre individuos *relationship* (R) a partir de datos genéticos codominantes (por ejemplo, microsatélites), el cuál se basa en el algoritmo de Milligan (2003); éste estimador exhibe menor error estándar, a diferencia de los estimadores basados en probabilidad que suele tener un mayor sesgo especialmente cuando la cantidad de información genética es menor. (Milligan, 2003). El programa fue diseñado para leer *loci* microsatelitales con alelos nulos. Mientras que el programa COANCESRTY utiliza un logaritmo bayesiano con siete métodos distintos para calcular las relaciones de parentesco entre individuos (r). Los cuales son: LynchRd (Lynch y Ritland, 1999), Ritland (Ritland, 1996), QuellerGT (Queller y Goodnight, 1989), Wang (Wang, 2002), TrioML –*Triadic likelihood estimator*– (Wang, 2007), DyadML (Milligan, 2003) y LynchLi (Li, 1993; Lynch, 1998). Para nuestros análisis y debido a que representan alrededor de 104 mil datos, se realizó un consenso de los diferentes métodos. A partir de los valores de Relatedness (r), se asignaron diferentes categorías de relaciones de parentesco: PO (Padre-Hijo) $r > 0.5$, FS (Hermanos) $0.25 > r > 0.49$, HS (Medios Hermanos) de $0.125 > r > 0.249$ y por último U (sin parentesco) $r < 0.124$. Para realizar las gráficas de pedigrí que se muestran en resultados solo se utilizó la categoría de PO (Padre-Hijo).

Resultados

Cruzas de reproductores y generación F1

Para la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂, se obtuvieron 579 huevos, con una diámetro promedio del huevo de $\bar{x}= 1031 \mu\text{m}$ y la longitud de larva fue de $\bar{x}= 5.69 \text{ mm}$. Mientras que para la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂, se obtuvieron 458 huevos, con un tamaño promedio del huevo de $\bar{x}= 1063 \mu\text{m}$, el tamaño promedio de la larva de $\bar{x}= 5.80 \text{ mm}$. En la Tabla 8 se describen de manera resumida los cambios y la diferencia de días durante el desarrollo temprano en las cruces de *Chirostoma humboldtianum*.

Tabla 8. Comparación del desarrollo embrionario en la F1 de las cruces de poblaciones silvestres Tiacaque y Tepuxtepec de *Chirostoma humboldtianum*.

Desarrollo embrionario Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂	Día	Paso y Descripción	Día	Desarrollo embrionario Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂
1	<i>Fertilización</i> Formación del espacio previtelino.	1

<i>Disco germinal</i> Formación del poro animal y del blastodisco, se unen los núcleos masculino y femenino.

<i>División 2 células</i> La segmentación tiene lugar en el blastodisco. Primera división meridional.

División 4 células

División perpendicular.

División 8 células

División en forma paralela.

Mórula

Se presenta cuando el citoplasma se ha repartido completamente en todos los blastómeros que conforman el huevo.

Blástula

No presenta conexiones con el vitelo; en este paso comienza la transcripción de su genoma.

2

2

Gástrula

Formación del escudo embrionario, anillo germinal, tubo neural y cefalización.

3

3

Embrión

Formación de cápsulas ópticas y vesículas ópticas, aparecen algunos melanóforos. Inicia la circulación sanguínea.

6

4

7 *Embrión*
Inicia
pigmentación de
los ojos.
Comienzan la
contracción
muscular.

8 *Embrión*
Ojos reflejantes.
El corion se
vuelve
permeable y se
da un
intercambio
gaseoso con el
ambiente, los
glóbulos rojos se
pigmentan.

10 *Eclosión*
8
Eleuteroembrión
Alimentación
endógena ya que
aún cuenta con
el saco vitelino
y la gota de
aceite.

13 *Apterolarva*
Fase en el que el
embrión se
termina el saco
vitelino y
comienza una
alimentación
mixta.

17 *Pterolarva*
Alimentación
exógena
Desarrollo de
aletas, flexión
de la notocroda

40 Formación de
radios en todas
las aletas

Posición de los melanóforos

Juvenil
Presenta las características del adulto. Escamas, radios de las aletas formados. Esta etapa transcurre hasta la maduración sexual.

En la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ se obtuvieron huevos y larvas con ciertas malformaciones (13% en el total de huevos y larvas) (Tabla 9). En las imágenes se puede observar un crecimiento inadecuado de las células blastodermicas en los huevos y anomalías esqueléticas en el eje vertebral en las larvas.

Tabla 9. Malformaciones en huevos y larvas de la cruce de Tiacaque ♀ y Tepuxtepec ♂.

Análisis de Supervivencia y Morfológicos

Supervivencia

En la figura 4 se presenta el porcentaje de supervivencia desde la fertilización hasta la eclosión. Se incorporaron los resultados generados por alumnos del Proyecto de investigación de Hidrobiología (PDI) (Daniel Gallegos & Uriel Martínez, 2017) de las poblaciones Tiacaque y Tepuxtepec en PExPA se determinó y se comparó la supervivencia de las poblaciones en cautiverio y la F1 (Figura 4). Se observó una mayor supervivencia en las poblaciones en cautiverio que en la F1 generada, siendo la población de Tiacaque la que mostró un mayor porcentaje (87 %) seguido de la población de Tepuxtepec con 77 %, mientras que en las cruas de híbridos intraespecíficos se observó una mayor supervivencia en la crua de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (42 %) que en la crua Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (39 %).

En la figura 5 se presenta la supervivencia de las dos cruas generadas (F1) hasta el periodo juvenil (203 días post eclosión) y se realizó una comparación únicamente de la F1 (Figura 5) en donde se observó una mayor supervivencia en la crua de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ con 17 %, mientras que la crua de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ fue de solo 3 % (Figura 5).

Figura 4. Sobrevivencia en poblaciones en cautiverio Tiacaque (color azul) y Tepuxtepec (morado) y para la F1 Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (color verde) y Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (rosa) desde la fecundación del huevo hasta la eclosión.

Figura 5. Sobrevivencia en la F1 de las cruzas de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (color verde) y Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (rosa) desde la activación del huevo hasta el periodo juvenil (203 dpe).

Longitud y peso

En la Figura 6 y 7; Apéndice 2; Tabla 12 se presentan los resultados de la talla y peso de los progenitores, se observa que la mayoría de los organismos tienen la misma longitud y peso, con un promedio de 159.5 mm (LT) y 32250 mg (P).

Respecto a la relaciones biométricas en los juveniles, no existieron diferencias significativas (*t-student* $P=0.00001$) entre la longitud total, la longitud notocordal (LT, LNC) y el peso (P) en la F1 de *C. humboldtianum*, (Figura 8, 9, 10 y 11; Apéndice 2, Tabla 13 y 14). Sin embargo, la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ fue la que mostró una mayor talla y peso, con un promedio de LT = 55.515 mm y LNC = 46.873 mm y peso de 0.908 mg y la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ mostró una menor talla y peso con un promedio de LT= 44.292 mm y LNC= 37.354 mm y peso de 0.480 mg.

Figura 1. Longitud de Reproductores, las barras en color azul claro muestran los datos de cruce de los reproductores Tiacaque ♀ X Tepuxtepec. Las barras azul obscuro representan los datos de los progenitores de la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂.

Figura 2. Peso de Reproductores, las barras en color rosa claro (peso) muestran los datos de cruce de los reproductores Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂. Las barras rosa obscuro representan los datos de los progenitores de la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂.

F1 Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂

Figura 8. F1 de la crucea Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ . 203 después de la eclosión (dpe).

F1 Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂

Figura 9. F1 Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂. En el apéndice 2 se muestran todos los organismos de esta crucea con 203 dpe.

Figura 10. LT=Longitud Total (color azul) yLNC= Longitud Notocordal (color amarillo) para la F1. T♀ X Tx♂=Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂; Tx♀ X T♂= Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂.

Figura 11. Peso Total para cada una de las cruces. T♀ X Tx♂=Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂; Tx♀ X T♂= Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂. Gráficas realizadas con R.

Análisis Genéticos

Genotipificación de poblaciones silvestres, tamaño alélico y alelos nulos

Un total de ocho *loci* microsatélites fueron estandarizados y amplificados adecuadamente (Chum 12, 14, 44, 55, 58, 60 62 y 69) para los 171 individuos ($N_{PS}= 96$; $N_R= 8$; $N_{F1}= 67$). Se detectó la presencia de alelos nulos en los microsatélites, sin embargo, no en todas las poblaciones. Así mismo, el análisis realizado con el programa FreeNA mostró que no existen diferencias significativas aplicando el algoritmo para corrección de alelos nulos $F_{ST} = 0.2774$ (0.2004-0.3841) $F_{STena}= 0.2299$ (0.1607-0.3083), por lo tanto no se excluyó ningún *locus* en el análisis.

Variación genética, prueba del equilibrio de Hardy-Weinberg y recombinación

Todos los *loci* analizados fueron polimórficos en las muestras y se encuentran fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg (Tabla 10). Con la prueba de recombinación, no se detectó desequilibrio por ligamiento entre ninguno de los *loci*.

Con respecto a la variación genética se observaron un total de 87 alelos en todas las poblaciones del estudio (Apéndice 3; Tablas 15 y 16) siendo el marcador Chum 69 el que presentó el mayor número de alelos (17), seguido por 16 alelos para el Chum 62, 13 alelos para el Chum 58 y 11 alelos para el Chum 44, mientras que Chum 12, 14, 55 y 60 tuvieron menos de 10 alelos (Apéndice 3; Tabla 16). En tabla 16 se muestran las frecuencias alélicas por población (Apéndice 3; Tabla 16). La riqueza alélica total fue de 10.875. Siendo la población silvestre de Tepuxtepec la que mostró el mayor número de alelos (Apéndice 3; Tabla 15), con un promedio de 8.875, seguido de la población silvestre de Tiacaque con 5.250; por su parte los reproductores y la progenie mostraron un número promedio muy parecido entre ellos, siendo los reproductores de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ los que cuentan con el mayor número de alelos (Rep T = 4), seguido de la progenie de esta misma cruce (F1 PT) con 3.50, mientras que los padres y la progenie de la cruce

recíproca mostraron valores menores ($RTx = 3.125$; $F1 PTx = 3.250$). Es importante resaltar que en esta última progenie y en un reproductor (hembra) se observaron individuos tetraploides: $RTx2$, $PTx 9$, $PTx10$, $PTx12$, $PTx14$ y $PTx17$ (Apéndice 3; Figura 17); lo cual implicó un reto al momento de realizar los análisis, ya que la mayoría de las paqueterías de análisis genéticos son para organismos diploides, por lo que se tuvo que tomar los picos mas externos como el tamaño de los alelos, lo cual podría implicar un sesgo al tomarlos como diploides en el estudio sobre diversidad genética.

La mayoría de los *loci* comparten alelos en las diferentes poblaciones silvestres, sin embargo, en los reproductores (población cautiva) y en la progenie generada se observaron algunos alelos únicos, los cuales solo se comparten entre padres e hijos, no encontrándose en las poblaciones silvestres de Tiacaque y Tepuxtepec. Tal es el caso de los alelos 152, 188 y 192 del *locus* Chum 12; los alelos 140 y 144 del Chum 14 y el alelo 232 del Chum 69 (Apéndice 3; Tabla 16).

En todas las poblaciones se observó una mayor heterocigosis esperada que observada, siendo la población silvestre de Tepuxtepec la que mostró mayor número de heterocigos observados y esperados ($H_o = 0.299$; $H_E = 0.759$), los reproductores de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (población cautiva Rep Tx $H_o = 0.25$; $H_E = 0.758$) seguido de la progenie (PTx) de esta cruce $H_o = 0.216$ y $H_E = 0.509$. Mientras que los reproductores de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (Rep T) mostraron un menor número de heterocigos observados ($H_o = 0.2$ y $H_E = 0.738$) y su progenie (PT) obtuvo el menor número de heterocigos de todas las muestras analizadas $H_o = 0.101$ y $H_E = 0.414$.

Por otro lado, todas las muestras mostraron un número significativo, positivo y alto del coeficiente de endogamia (F_{IS}), lo que sugiere que la desviación puede deberse a la deficiencia de heterocigos; siendo la F1 o progenie de la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (PT) la que presenta el valor más alto ($F_{IS} = 0.753$), seguido de los reproductores (padres) de esta cruce (Rep T, $F_{IS} = 0.729$), las poblaciones silvestres Tiacaque y Tepuxtepec mostraron entre ellas un valor

similar de coeficiente de endogamia ($F_{IS} = 0.6614$ y 0.605 respectivamente). La crucea Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ mostró el valor más bajo de coeficiente de endogamia ($F_{IS} = 0.576$) (Tabla 10).

Tabla 10. Índices de diversidad genética para ocho loci microsatélites para las poblaciones silvestres Tiacaque y Tepuxtepec, así como los Reproductores y F1. N: número de individuos, RA: riqueza alélica, H_O : Heterocigosis observados, H_E : Heterocigosis esperada, F_{IS} : coeficiente de endogamia.

Población	N	RA	H_O	H_E	F_{IS}
Tiacaque	48	5.2	0.187	0.553	0.661 *
Tepuxtepec	48	8.8	0.299	0.759	0.605*
Rep Tx	3	3.1	0.250	0.758	0.670*
Rep T	5	4.0	0.200	0.738	0.729*
F1 PTx	19	3.2	0.216	0.509	0.576*
F1 PT	48	3.5	0.101	0.414	0.753*

Los * indican los valores que fueron significativos y desviaciones para la prueba del equilibrio de Hardy-Weinberg.

Los resultados de AMOVA, no mostraron diferencias significativas entre las dos pruebas, por lo que solo se presentan los resultados de la primera prueba que incluye a todos los individuos analizados (Tabla 11). Se observa que la mayor parte de la variación en *Chirostoma humboldtianum* se encuentra dentro de las muestras/poblaciones con 71.1 %, mientras que la variación entre poblaciones fue menor 28.8 %.

Tabla 11. Análisis de varianza molecular AMOVA de las diferentes poblaciones silvestres, reproductores y F1.

Fuente de Variación	Suma de cuadrados	Varianza	% de Variación
Entre poblaciones	243.747	0.944	28.860
Dentro de la población	755.073	2.328	71.140
Total	998.82	3.273	100

Estructura genética y análisis de cuello de botella

De acuerdo con los análisis de estructura poblacional con el software Structure y la prueba de Evanno (2005), con un total de 171 individuos, se resolvieron tres grupos bien definidos con una $K=3$ (tres pozas génicas), con una probabilidad posterior de -3356.1 y una varianza de 139.4 (Figura 12; Apéndice 3 y Figura 16). En la figura 12 se observa que las poblaciones silvestres

Tiacaque (color azul, 1) tiene claramente su propia poza génica con un total de 95 % de individuos de esta población asignados a su poza génica, por su parte el 97 % de los individuos de la población silvestre de Tepuxtepec se agruparon en la misma poza génica (color morado, 2) y se obtuvo un valor de $F_{ST}= 0.23876$ entre poblaciones silvestres (Tiacaque y Tepuxtepec). Por otro lado, el 96 % de individuos de las poblaciones en cautiverio (Reproductores y F1) mostraron una misma poza génica con flujo génico entre ellas (rosa, 3), presentando algunos alelos compartidos con la población silvestre de Tiacaque (líneas azules) y pocos alelos compartidos con Tepuxtepec (líneas moradas), lo cual indica que son individuos descendientes de estas poblaciones.

Figura 12. Análisis de estructura genética realizado con el software Structure y graficado con el programa estadístico R. Se observan tres grupos genéticos o pozas génicas con una $K=3$. Cada individuo es una línea vertical. Tiacaque poza génica azul, Tepuxtepec morado y reproductores (RTx y RT) y F1 (PTx y PT) rosa.

En la Figura 13 se muestra la matriz de valores de F_{ST} pareadas, en donde los cuadros blancos indican valores de 0, es decir, que las poblaciones son muy parecidas y los cuadros azules muestran la diferenciación entre ellas. Los valores de F_{ST} pareadas entre las diferentes poblaciones sugieren

que las poblaciones silvestres Tiacaque y Tepuxtepec se encuentran diferenciadas ($F_{ST} = 0.23876$). Sin embargo los reproductores fueron muy parecidos con valores muy pequeños en ellos de $F_{ST} = 0.02248$, la comparación entre las dos progenies o F1 también tiene valores bajos de $F_{ST} = 0.1646$ (Figura 13; Apéndice 3; Tabla 17).

Figura 13. F_{ST} pareadas para las poblaciones silvestres (Tiacaque y Tepuxtepec), reproductores (Rep T, Rep Tx) y la progenie (F1 Pt, F1 PTx).

De acuerdo con la prueba de Wilcoxon con dos colas, bajo el modelo TPM (Two Phase Model), se obtuvieron diferentes resultados en las muestras analizadas. Ya que para la población silvestre de Tepuxtepec bajo el modelo de $TPM_{Tx} = 0.039063$, el valor no fue significativo, de igual manera para la población cautiva de reproductores (RTx y RT) y F1 (PTx) de la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂, $TPM_{RTx} = 0.039063$, $TPM_{RT} = 0.054688$, $TPM_{PTx} = 0.011719$ respectivamente, por lo que no hay evidencia de una reciente reducción en el tamaño poblacional, es decir, un reciente cuello de botella. Por su parte, la población silvestre de Tiacaque bajo el modelo $TPM_T = 0.742188$ y la F1 de la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (PT) mostraron valores significativos de $TPM_{PT} = 0.945313$, lo cual sugiere que hay desviaciones del equilibrio mutación-deriva. Sin embargo estos

resultados se deben de tomar con mucha cautela debido al pequeño número de muestra para estas poblaciones, dado que el programa es muy susceptible al número de individuos.

Análisis de Parentesco -Pedigrí-

Los resultados obtenidos a partir de los distintos métodos de relación de parentesco o pedigrís, para la categoría PO (Padre-Hijo), se tomó la relación de la F1 con hembras (madres) como verdadera debido a que los machos fecundaron a varias hembras, encontrando a algunos individuos en diferentes combinaciones de parentesco.

De las diferentes combinaciones realizadas (Apéndice 3; Tabla 18 y 19), para la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (Figura 14), se obtuvieron un total de 48 peces hasta el estadio juvenil, de los cuales el mayor número de descendientes (12 individuos) se obtuvieron de la cruce de RT2 ♀ X RTx4 ♂, seguido de las cruces de RT2 ♀ X RTx3 ♂ y RT1 ♀ X RTx 4♂ (10 individuos cada una), la cruce de RT1 ♀ X RTx 3♂ (7 individuos), mientras que para la cruce de RT1 ♀ X RTx5 ♂ fueron 5 individuos, obteniéndose el menor número de descendientes en la cruce de RT2 ♀ X RTx5 ♂ (4 individuos). En general el macho reproductor RTx4 ♂ fue el que se observó un mayor número descendientes o *matches*, mientras que para el reproductor RTx5 ♂ se obtuvo el menor número de progeie o F1. Por su parte, para la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (Figura 15) se obtuvo un total de 19 peces juveniles en diferentes combinaciones, todos fueron hermanos o medios hermanos ya que solo un macho contribuyo en las cruces. Se observa una mayor descendencia con la hembra RTx1 ♀ X RT3 ♂ (11 individuos), mientras que para la cruce RTx2 ♀ X RT3 ♂ se obtuvieron 8 individuos.

Tiacaque ♀ X *Tepuxtepec* ♂

Figura 14. Análisis de parentesco para las diferentes combinaciones en las cruza de Tiacaque ♀ con Tepuxtepec ♂. Los círculos indican a las hembras, los cuadros a los machos y los rombos indican sexos indiferenciados en la progenie o F1. Cada número corresponde al individuo analizado. El color azul corresponde a los reproductores de Tiacaque, el color morado a los de Tepuxtepec y el rosa corresponde a la progenie. Las líneas negras indican el apareamiento de los individuos y su descendencia.

Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂

Figura 15. Análisis de parentesco para la cruce de Tepuxtepec ♀ y Tiacaque ♂. Los círculos indican las hembras, los cuadros los machos y los rombos indican el sexo indiferenciado que en este caso es la progenie (F1). Cada número corresponde al individuo analizado. El color azul corresponde a los reproductores de Tiacaque, el color morado a los de Tepuxtepec y el rosa corresponde a la progenie. Las líneas negras indican el apareamiento de los individuos y su descendencia.

Discusión

Cruzas de reproductores y generación F1

Se demostró que la producción de híbridos intraespecíficos producidos por medio de fertilización *in vitro* es viable entre poblaciones silvestres que se encuentran totalmente disjuntas de *Chirostoma humboldtianum*, además la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂, presentó un tiempo de desarrollo temprano menor en comparación con la cruce Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (72 días vs 88 días). Sin embargo, se observó que la tasa de sobrevivencia en los híbridos intraespecíficos fue mucho menor que en las poblaciones Tiacaque y Tepuxtepec (T=87 %; Tx=77 %; PTx=39 %; PT=42 %). No obstante, la producción de organismos híbridos podría tener implicaciones favorables con un enfoque hacia el desarrollo de una biotecnología para el cultivo de esta especie, con fines de producción y con la finalidad de contrarrestar la sobreexplotación de poblaciones silvestres. Se deben de considerar las limitaciones debido a que la gametogénesis y el desove son asincrónicos en las hembras y la fecundidad es relativamente baja en esta especie (en comparación con especies de importancia acuícola; v. g. salmónidos, ciprinidos, cíclidos).

En la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂, el 13 % de las larvas presentó malformaciones en las fases de división celular y en el eje vertebral en las larvas. Estas malformaciones tuvieron lugar desde los primeros estados de desarrollo y pueden estar asociadas a una degeneración de las estructuras óseas, a la calidad del vitelo, condiciones abióticas desfavorables, desbalances nutricionales, enfermedades y factores genéticos como la endogamia o la exogamia (Cahu et al., 2003; Georgakopoulou et al., 2007; Verhaegen et al., 2007) o una interacción entre éstas. Las malformaciones esqueléticas, especialmente craneales y a nivel del eje vertebral, han sido reportadas en casi todas las especies de peces de cultivo, se presentan principalmente durante la ontogenia temprana y hasta la metamorfosis (Argüello et al., 2014).

Por otro lado, la nutrición larval particularmente de ácidos grasos o niveles de ciertas vitaminas y minerales, también ha sido implicada en la ocurrencia de malformaciones. El ácido ascórbico (vitamina C) en la dieta es un factor que influye en el desarrollo de las malformaciones esqueléticas en teleósteos juveniles y adultos, siendo esencial para la producción de colágeno y para la correcta formación de las estructuras óseas y cartílagos de soporte (Gapasin & Duray, 2001). El ácido retinoico (AR) está involucrado en la diferenciación, crecimiento y desarrollo de las células. Es posible que para los especímenes del presente estudio, la alta tasa de crecimiento y el mayor número de larvas de la cruce de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (N = 48), pueden tener altos requerimientos de AR y vitamina C, ya que solo en esta cruce se presentaron ese tipo de malformaciones.

Sin embargo, aunque es necesario un mejor entendimiento del rol de estas vitaminas en el metabolismo de tejidos esqueléticos, es posible inferir que las malformaciones pueden ser una interacción de los factores anteriormente descritos, y también pueden atribuirse al estado nutricional de las hembras progenitoras ya que la calidad y la cantidad del vitelo en las primeras fases del desarrollo es consecuencia de la calidad del alimento proporcionado durante el proceso de gametogénesis, estos factores determinan la sobrevivencia de los peces durante la alimentación endógena.

Sobrevivencia y Morfología

Sobrevivencia

La población que tuvo una mayor sobrevivencia desde el momento de la activación del huevo hasta la eclosión fue la población de Tiacaque con 87 %, seguida de la población de Tepuxtepec con 77 %, mientras que la F1 de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (PTx) mostraron una menor sobrevivencia de 42 % y Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (PT) 39 %. A la F1 se le dio seguimiento hasta el periodo juvenil en donde la cruce de la población Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ mostró una

mayor sobrevivencia que en la craza Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (17 % y 3 % respectivamente). En todas las muestras se observó un umbral durante la gastrulación. Balon (1993) menciona que existe un umbral entre cada par de periodos durante la ontogenia, ya que los organismos se encuentran sensibles a los factores ambientales.

Esta desigualdad también pueden ser atribuidas a la cantidad de alimento que no fue controlada en los experimentos, además la primer craza que se realizó en este estudio fue la de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ en donde se tenía menos experiencia con el manejo de los individuos y control de plagas como fue el caso de los hongos que invadieron a esta progenie. También pudo haber influido la depresión por exogamia en esta craza (PTx ; $H_E=0.509$; $F_{IS}=0.576$), ya que se observó un aumento en individuos heterocigos, en la cuál aunque se incrementa la variación genética, se pierden adaptaciones locales o particulares de cada población independiente y lo cual no está relacionado con un incremento en el vigor híbrido, ya que al observar una mayor mortalidad en esta craza, no se podría considerar el proceso de heterosis. Ya que en poblaciones que se encuentran aisladas (como Tiacaque y Tepuxtepec), los alelos se seleccionan por sus efectos positivos en ese ambiente en particular. Mientras que los mismos genes pueden tener efectos diferentes en nuevos entornos y por lo tanto la descendencia entre padres de dos poblaciones diferentes puede tener fenotipos que no son buenos para ninguna población en particular.

Longitud y peso

Un aspecto importante que hay que resaltar es que todos los organismos analizados fueron juveniles con 203 días post eclosión. Aunque no se encontraron diferencias significativas en las variables entre las dos cruza (*t-student*; $P=0.00001$), se detectó que la mayor longitud y peso fue en los organismos de la craza de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ ($\bar{x}$ LT 55.515 mm y Peso 0.908 mg). Esta diferencia de crecimiento puede ser atribuido a que en esta craza se obtuvo un menor número de individuos (PTx , $N = 19$ vs $PT = 48$), por lo que la densidad de los organismos, así como la

cantidad de alimento, pudieron influir en el crecimiento de los peces, ya que al aumentar la cantidad de organismos, aumenta la demanda de alimento y la competencia para obtenerlo (Del Río, 2004). Como se mencionó en la sección de materiales y métodos, la F1 fue mantenida en canaletas de las mismas dimensiones, por lo cabe hacer notar que la baja densidad de organismos pudo redundar en permitir un incremento en la talla en relación a la craza PT (N = 48)

Genética

Variación genética, prueba del equilibrio de Hardy-Weinberg y recombinación

Todas las poblaciones analizadas con marcadores microsatelitales mostraron desviaciones al equilibrio de Hardy-Weinberg, debido a la deficiencia de heterocigotos, lo cual puede ser atribuido a procesos evolutivos (se discute detalladamente más adelante). Se encontraron un total de 87 alelos en todas las muestras analizadas, con un promedio total de riqueza alélica de 10.875. Comparando nuestro resultados con los obtenidos por García-Martínez (2015) y Barriga Sosa et al. (2014) en donde en el primer estudio, realizaron un análisis de seis poblaciones de *Chirostoma humboldtianum*, con diferentes marcadores microsatelitales; los autores mencionan un total de 169 alelos para ocho *loci*, con un promedio de riqueza alélica de 21.1 alelos por cada *locus*. Mientras que para el segundo estudio, para la población de Villa Victoria se encontró un promedio de 15 alelos, una $H_O = 8.83$ y $H_E = 0.79$ con los mismos ocho *loci* utilizados en el presente trabajo. En otras especies de peces con importancia acuícola, como son el rodaballo, la riqueza alélica con marcadores microsatelitales es de 14.1 alelos; 8.4 en trucha arcoíris (Vandeputte et al., 2004) y en trucha dorada mexicana un promedio de 11.9 alelos por *locus* (Barriga Sosa et al. 2016). García-Martínez, 2015 reportó una riqueza alélica en la población de Tepuxtepec de 7.91 y para Tiacaque un promedio de 9.36 a diferencia de nuestro estudio en donde se observó un pequeño incremento en la riqueza alélica en la población de Tepuxtepec con un promedio de 8.87, mientras que para la población de Tiacaque se observó una disminución de la riqueza alélica con un promedio de 5.25.

En nuestro estudio, la población silvestre de Tepuxtepec fue la que mostró mayor número de heterocigotos ($H_E = 0.75$) y en la población de Tiacaque una $H_E = 0.55$, a diferencia de lo que reporta García-Martínez (2015) en donde para la población de Tepuxtepec presentó $H_E = 0.59$ y Tiacaque $H_E = 0.66$. Estas diferencias pueden ser atribuidas a las diferentes marcadores moleculares utilizados en los estudios, ya que algunos marcadores pueden tener mayor diversidad en un fragmento en específico del genoma.

La mayoría de *loci* comparten alelos en las diferentes poblaciones silvestres, sin embargo en los reproductores y en la progenie generada (población cautiva) se observaron algunos alelos únicos que solo se comparten entre padres e hijos, sin que los presenten las poblaciones silvestres de Tiacaque y Tepuxtepec. Estos alelos únicos o raros se encontraban en bajas frecuencias en las poblaciones silvestres y se han llegado a fijar en las poblaciones cautivas. Por su parte los reproductores y la progenie mostraron un número de riqueza alélica promedio total muy parecida, oscilando entre 3 y 4 alelos por *locus* ($Rep\ T = 4$; $F1\ PT = 3.5$; $Rep\ Tx = 3.1$; $F1\ PTx = 3.2$); estos datos se deben de tomar con cautela, sobretodo en los reproductores, debido al pequeño tamaño de muestra ($N_{RT} = 5$; $N_{RTx} = 3$) ya que la riqueza alélica es muy sensible al tamaño muestral.

Comprando nuestros resultados sobre los híbridos intraespecíficos, con otros estudios de hibridación y especies con importancia acuícola, como es el caso de *Salmon salar* (Ayllon, 2004) en donde se utilizaron cuatro microsatélites, la heterocigosis oscila entre $H_E = 0.818$ ($N = 44$). A diferencia de la baja heterocigosis encontrada en nuestro estudio en la F1; la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ ($F1\ PTx$, $N = 19$) fue de $H_E = 0.509$, mientras que la progenie de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ ($F1\ PT$, $N = 48$) obtuvo el menor número de heterocigos en todas las poblaciones analizadas ($H_E = 0.414$). Estas diferencias pueden deberse a varios factores: 1) al reducido tamaño de muestra; 2) a un muestreo no azaroso inherente al tamaño del sistema cerrado en donde se encuentra nuestra población cautiva, que consiste de un lote pequeño de 10 a 17 reproductores en

diferentes fases reproductivas y 3) a los procesos microevolutivos en las poblaciones silvestres que se describen en los siguientes apartados.

La hibridación intraespecífica es común en algunas especies de importancia pesquera como es el caso de los salmónidos (Fraser et al. 2010; Harbicht et al., 2014). Los híbridos intraespecíficos (F1) generados en este estudio mostraron muy baja diversidad genética a diferencia de lo reportado con otras especies de híbridos intraespecíficos como *Salvelinus fontinalis* (Harbicht et al., 2014) en donde los autores mencionan que después de cinco generaciones, las poblaciones muestran rasgos benéficos ya que exhiben un mayor adaptación potencial que da como resultado una mayor supervivencia y plasticidad fenotípica, también sugieren que los genes “domesticados”, entre las primeras generaciones de híbridos, proporcionan una ventaja en la adecuación (*fitness*) en nuevos entornos, como consecuencia de la elevada diversidad genética (Dowling y Secor 1997; Harbicht et al., 2014).

Nuestra primera generación híbrida mostró una elevada mortalidad al compararlo con las poblaciones silvestres y puede ser atribuido a la combinación de diversos factores como: 1) baja diversidad genética; 2) posible pérdida de alelos debido a procesos de selección; 3) adaptación al nuevo entorno; 4) endogamia; 4) reducidos tamaño efectivo poblacional (N_e) y tamaño poblacional (N) y 5) deriva génica.

Para nuestras poblaciones que se encuentran en cautiverio, existen problemas adicionales, ya que al empezar un proceso de domesticación o selección artificial inconsciente y adaptación al entorno cautivo se plantea un problema particularmente grave, porque puede promover la fijación de alelos que en la naturaleza son perjudiciales, lo que resulta en una carga genética permanente que no puede ser purgado por la selección purificadora. Ya que en poblaciones en cautiverio la selección se puede “relajar”, debido a la ausencia de depredadores, la provisión de alimentos, y el tratamiento médico veterinario (Arnoldo, 1995). Periodos de baja diversidad genética puede poner

en riesgo de extinción a la especie (Bürger & Lynch, 1994). Adicionalmente las tasas de mutación para un solo *locus*, como resistencia a cierta enfermedad, se pueden encontrar hasta tres ordenes de magnitud abajo (Lynch et al., 1998; Franklin y Soulé 1980). Aunado, a que las poblaciones en cautiverio descienden de pequeños tamaños poblacionales, con eventos de cuellos de botella en las poblaciones silvestres, aumentarán la probabilidad de acumulación de alelos deletéreos y la pérdida de variación genética por causa azarosa de la deriva genética.

Todas las muestras analizadas mostraron un número significativo, positivo y alto de coeficiente de endogamia (F_{IS}), lo que indica deficiencia de heterocígos. Las poblaciones silvestres Tiacaque y Tepuxtepec mostraron valores semejantes ($F_{IS} = 0.661$ y $F_{IS} = 0.605$ respectivamente). El menor número de coeficiente de endogamia F_{IS} se observó en los híbridos intraespecíficos de la crusa de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ (F1 PTx $F_{IS} = 0.576$), lo cual puede ser atribuido a un proceso de exogamia (como mencionamos anteriormente), ya que en poblaciones aisladas se pueden desarrollar diferentes complejos de genes que interactúan bien dentro de una población en particular, pero de manera deficiente cuando los genes se mezclan a través de apareamientos entre poblaciones, causando una mayor mortalidad y una reducción en el estado físico en la descendencia. Algunos genes adaptados localmente en una población silvestre pueden diferir de una población en cautiverio. En este caso, los genes adaptativos en poblaciones silvestres simplemente están siendo desplazados por la inmigración de genes que se adaptan al nuevo ambiente (Monson et al. 2010).

Por su parte, la F1 de la crusa de Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ (PT) mostró el mayor número de coeficiente de endogamia ($F_{IS} = 0.753$) y fue en la crusa que se presentaron las malformaciones. Es importante recordar que la endogamia puede tener consecuencias perjudiciales en todos los aspectos de la reproducción y supervivencia, incluida la producción de espermatozoides, capacidad de apareamiento, fecundidad, supervivencia juvenil y edad de madurez sexual (Frankham et al.

2002). Hay evidencia contundente de que la endogamia y la pérdida de variación genética contribuyen al riesgo de extinción en poblaciones en cautiverio. Ignorar los factores genéticos puede llevar a estrategias de recuperación inadecuadas e incluso procesos de extinción (Frankham, 2005). Se ha observado que la depresión por endogamia causa deformaciones corporales y una menor supervivencia de la prole en *Oncorhynchus mykiss* (Waldman, 1993), una reducción en las tasas de crecimiento en *Oncorhynchus kisutch* (Gallardo y Neira, 2005), menor tolerancia a la salinidad en *Poecilia reticulata* (Nakadate et al. 2003) y una reducción en la fecundidad y la supervivencia en *Gasterosteus aculeatus* (Frommen et al. 2008; Monson et al. 2010). Nuestros resultados concuerdan con lo reportado por García-Martínez (2015), en *Chirostoma humboldtianum*, en donde se menciona que estas poblaciones han sufrido depresión por endogamia y la deficiencia de heterocigotos también ha sido sugerida para otras especies del género (Barriga-Sosa et al. 2004). Por lo que se sugiere realizar análisis de adecuación en las poblaciones silvestres para poder determinar si existe un proceso de depresión por endogamia en esta especie.

Cabe destacar que al ser este el primer estudio y generación de hibridación intraespecífica en una especie endémica y con características biológico-pesqueras completamente contrastantes a las de especies cultivables (v. g. salmónidos, ciprinidos, cíclidos), da la pauta para considerar aspectos relevantes para mejorar futuros diseños experimentales que conduzcan a la obtención de resultados esperados, por ejemplo: 1) v. g., analizar los índices de heredabilidad en los reproductores; 2) realizar un análisis y selección *a priori* de características fenotípicas y genotípicas de los reproductores; 3) incrementar el número de organismos reproductores provenientes del muestreo directo de las poblaciones silvestres; 4) aumentar el número de reproductores por cruce en poblaciones cautivas o analizar cruces 1:1 y su descendencia; 5) seguir un mayor número de generaciones; 6) realizar cruzamientos de poblaciones que tengan mayor similitud genéticamente para poder evitar la acción de la exogamia; 7) valorar el número y tipo de *loci* a utilizar; 8)

robustecer las estrategias de manejo acuícola (ei. alimentación, temperatura y aislamiento de reproductores en zonas controladas).

Organismos tetraploides

En el presente estudio se encontraron individuos tetraploides de *Chirostoma humboldtianum* (RTx2, PTx9, PTx10, PTx12, PTx14 y PTx17), únicamente en la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ lo cual puede sugerir que se esté heredando esa duplicación de alelos vía materna, es decir de la población silvestre de Tepuxtepec; ya que García-Martínez (2015) y Urbina-Sánchez et al. (2016) reportan organismos poliploides en esta misma población silvestre, lo cual los autores atribuyen a la exogamia observada en algunos *loci*. Sin embargo, se ha reportado que varios grupos de peces, incluyendo todos los salmónidos y catastómidos, así como la carpa (*Cyprinus carpio*) y algunos lochas (*Botia sp.*), han surgido a través de ancestros tetraploides (Bailey et al., 1978).

Por ejemplo, los salmónidos parecen haber retenido el 50-75 % de sus *loci* como duplicados durante los 108 años transcurridos desde que ocurrió la tetraploidía (Bailey et al., 1978). En poblaciones tetraploides, los alelos nulos en los *loci* se acumulan en los genes duplicados hasta que su frecuencia es equilibrado por la selección natural (Bailey et al., 1978; Lim, 1977). Los autores sugieren que estos genes duplicados es más probable que contribuyan a la evolución de nuevas funciones debido a que la selección permite que queden duplicados pero sin estar ligados (Bailey et al., 1978). También se han observado individuos tetraploides en las lochas (*Cobitidae*), los cuales se postula surgieron más recientemente que los catastómidos o salmónidos, y muestran una mayor tasa de pérdida de genes duplicados (70 %) (Ferris, 1977).

En este sentido, se considera necesario analizar a los ancestros del género *Chirostoma*, es decir, a alguna especie del género *Menidia* con análisis a nivel de genoma o de genómica comparada, para corroborar la herencia de genes poliploides en esta especie.

Estructura genética

Para determinar la estructura genética, es necesario comprender el patrón de variación genética de la especie por medio de la evaluación de los genotipos de los diferentes individuos. La estructura genética está influenciada tanto por procesos demográficos, como por la acción de las fuerzas evolutivas (Slatkin, 1994).

En el presente estudio la mayor parte de la variación (71 % $_{AMOVA}$) se encontró entre individuos en las muestras/poblaciones analizadas. Los valores F_{ST} (medida de diferenciación genética) fueron significativos en la mayoría de las agrupaciones (Tabla 16) y se observó el valor más alto entre la población silvestre Tepuxtepec – F1 Tiacaque ($F_{ST}= 0.279$), las poblaciones silvestres Tiacaque y Tepuxtepec también mostraron una fuerte diferenciación genética ($F_{ST}=0.238$). En todas las muestras se observó una baja heterocigosis por lo tanto una baja diversidad genética y una fuerte estructura poblacional ($K=3$: Tiacaque, Tepuxtepec, Reproductores y F1). Esta fuerte estructura poblacional y diferenciación genética en la especie de *Chirostoma humboldtianum* con marcadores microsatelitales y mitocondriales, también ha sido reportado por García-Martínez et al. (2015), en donde mencionan un alto valor de F_{ST} para Tiacaque-Tepuxtepec (0.394), baja variación genética y por lo tanto baja H_E , además de eventos de cuello de botella y el posible proceso de deriva genética en poblaciones silvestres.

Esta fuerte estructura poblacional y la alta diferenciación morfológica y genética entre estas las dos poblaciones silvestres de Tiacaque y Tepuxtepec eran de esperarse, y pueden verse influenciadas por factores como son: la contaminación, destrucción de hábitat y embalses que aumentan la fragmentación geográfica de esta especie, la introducción de especies exóticas, sobreexplotación, la inexistente dispersión ya que habitan en diferentes subcuencas, cada una con parámetros físico-químicos diferentes o una dispersión ancestral y por lo tanto el nulo flujo de genes, la existencia de individuos tetraploides en Tepuxtepec, que posiblemente señalen hacia un

proceso de especiación incipiente; todas estas diferencias eventualmente cambiarán las proporciones relativas de los componentes de la diferenciación genética y la diversidad dentro y entre las poblaciones. Es decir, las poblaciones están aisladas y se están diferenciando a tal grado que en el futuro podría llegar a constituir especies distintas, aunque de momento sólo se puedan considerar linajes diferentes.

Con respecto a las poblaciones cautivas en PExPA (Reproductores y F1), éstos mostraron una poza génica única entre padres e hijos y totalmente diferente a las poblaciones silvestres, por lo que adicional al posible efecto de un muestreo no aleatorio representado en dicho lote, al parecer algunos alelos raros que se encontraban en bajas frecuencias en las poblaciones silvestres, han aumentado su frecuencia e incluso se han fijado en la población cautiva; lo cual puede ser atribuido a procesos como son: la selección artificial inconciente, la adaptación al entorno cautivo, la endogamia y el efecto fundador, ya que las poblaciones en cautiverio descienden de un pequeño grupo de fundadores, los cuales a su vez tienen baja variación genética y probablemente contenían estos alelos raros. Estos cambios afectan las frecuencias alélicas y dan como resultado una decadencia de los heterocigotos en la población y al no existir nuevos individuos o genes en las poblaciones no hay flujo génico y empieza a existir apareamientos consanguíneos. Además de que probablemente existe un bajo tamaño efectivo poblacional en todas las poblaciones, el cual determina las propiedades genéticas de una población.

En poblaciones pequeñas, el azar y las fluctuación en las frecuencias genéticas (provocadas por la deriva genética) tiende a reducir la variación genética, llevando eventualmente a la homocigosidad y por lo tanto a la pérdida de adaptabilidad evolutiva a los cambios ambientales. Además de que las fluctuaciones temporales en el tamaño de la población son los principales factores que causan la reducción en los tamaños efectivos poblacionales (N_e) y se vuelven sustancialmente menores que sus tamaños reales (Lande 1998). Franklin y Soulé (1980)

propusieron una regla para determinar el valor del tamaño de una población en donde se mantenga una adecuada variación genética para procesos adaptativos para un ambiente dinámico, en donde determinaron un tamaño efectivo poblacional (N_e) de 500 individuos en poblaciones silvestres. Mientras que Franklin y Frankham (1998) proponen un valor de $N_e \sim 500-1000$ para cuestiones de conservación (Lynch et al., 1998). En poblaciones pequeñas o en cautiverio, donde la deriva génica es el mecanismo evolutivo de mayor influencia se debe considerar $N_{eL}=50$ (Wang, 2001). En ausencia de factores que actúen para mantener la variación genética, como la mutación, migración o la selección balanceadora, la tasa esperada de pérdida de heterocigosidad, es $2N_e$ por generación (Lande 1998).

Estudios teóricos y empíricos sobre peces muestran que las pequeñas poblaciones fundadoras pierden rápidamente los alelos raros, por causa de los apareamientos consanguíneos (Allendorf, 1986; Leberg, 1991). Por ejemplo, si se usa esperma de un solo macho para inseminar los óvulos de 100 hembras, el N_e es aproximadamente a una población de solo cuatro adultos, no 101 adultos, ya que toda la F1 de tal generación sería medio hermano porque comparte el mismo padre (Vrijenhoek 1998).

En este sentido, evitar completamente la selección artificial, la adaptación a un nuevo entorno, la endogamia, el posible efecto fundador, la deriva génica y por lo tanto la pérdida de diversidad genética puede ser difícil en poblaciones cautivas, pero se pueden hacer intentos para minimizar la endogamia y maximizar la baja diversidad genética dentro de las poblaciones, por ejemplo: 1) con el transporte de individuos (o gametos) de diferentes localidades con fines de reproducción (Rails & Bailou, 1986); 2) poniendo atención a las cuestiones ecológicas, demográficas o a los factores sociales y estructurales en la población (Lande 1998); 3) con la introducción periódica de individuos (genes) de las poblaciones de origen, incrementando la N_e y N en las poblaciones cautivas para que los nuevos individuos de la fuente de origen importen nuevos alelos a las

poblaciones en cautiverio y por lo tanto se incrementa la variación genética a lo largo del tiempo en nuestras poblaciones.

Nuestros resultados tienen implicaciones importantes para considerar el valor potencial de conservación de las poblaciones silvestres; mientras que las poblaciones en cautiverio ilustran la efectividad y lo rápido que pueden llegar a ser los procesos microevolutivos en un sistema cerrado y la importancia que tiene realizar un manejo adecuado de las poblaciones en cautiverio.

Análisis de Parentesco -Pedigrí-

La aplicación de marcadores microsatélites para la determinación de parentesco está ganando aceptación y popularidad en la acuicultura, ya que la inferencia de parentesco con marcadores genéticos codominantes altamente polimórficos cada vez es más común en los programas de mejora genética y como mecanismo para establecer pedigríes y líneas genéticas (Koch, 2008).

El reciente desarrollo de marcadores microsatelitales para esta especie (Barriga-Sosa et al. 2014) brinda la oportunidad de identificar el origen familiar de cualquier individuo en una población. La identificación de las genealogías pueden permitir la estimación precisa de los parámetros genéticos dentro de las poblaciones y proporcionar una prueba de asignación de escala más fina basados en los genotipos. Se han reportado poblaciones e hibridación para esta y otras especies del género (Alaye, 1996; Barriga-Sosa et al., 2001), sin embargo, estos datos deben ser puntualmente abordados en estudios posteriores.

En el presente trabajo, la mayoría de peces juveniles o híbridos intraespecíficos pertenecieron a la cruce Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂, con un total de 48 peces juveniles siendo la familia o cruce de los individuos RT2 X RTx4 la que presentó una mayor descendencia (12 individuos). Mientras que en la cruce de Tepuxtepec ♀ X Tiacaque ♂ se obtuvo un menor número de descendientes (19 peces juveniles) y la familia o cruce que obtuvo mayor número de hijos fue RTx1 ♀ X RT3 ♂ con un total de 11 individuos. Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que la mayoría

de la F1 generada o juveniles fueron homocigotos, y a su vez los reproductores o padres también mostraron un número alto de alelos homocigotos, por lo que no existe una combinación de alelos para que la F1 generada mostrará un incremento en individuos heterocigotos, además de que se observó un alto coeficiente de endogamia o apareamientos consanguíneos en todas las poblaciones analizadas. A diferencia de otros estudios en donde se ha demostrado en la trucha marrón (*Salmo trutta L.*) por una metodología de mejoramiento genético, que la cría podría producir un aumento de peso considerable (hasta 25% por generación; Vandeputte et al., 2002), o en la determinación de parentesco para evitar la acción de la endogamia en el lenguado japonés (Hara & Sekino, 2003), el bacalao del atlántico *Gadus morhua* (Herlin et al., 2007), el lenguado senegalés *Solea senegalensis* (Castro et al., 2006), entre otros estudios, en donde la preferencia de utilizar este marcador molecular es debido a su alto nivel de variación genética y son informativos a nivel intrapoblacional (Nolan, 2009; Soucy, 2003; Liu & Cordes, 2004).

Adicionalmente se demostró que los microsatélites fueron una herramienta precisa y confiable en todos los análisis descritos anteriormente y en la reconstrucción de pedigrí de poblaciones que se encuentran en cautiverio y que son cultivadas con fines de acuicultura, así como, la importancia de contar con diferentes líneas de reproducción para evitar endogamia en las poblaciones resultantes ya que toda esta información puede ser útil para desarrollar una población sintética con fines de manejo y producción acuícola, con la finalidad de contrarrestar la explotación de poblaciones silvestres.

Manejo y conservación

Los hábitats de peces dulceacuícolas se destruyen como consecuencia de muchos factores antropogenicos como es: la deforestación, la escorrentía agrícola, el uso de pesticidas, fertilizantes, aguas residuales y los contaminantes químicos, la erosión de las cuencas y la sedimentación ha

destruido los hábitats de reproducción de muchas especies que requieren aguas ricas en oxígeno. (Vrijenhoek 1998). La introducción de especies exóticas, fragmentación del hábitat, los embalses para la retención de agua y la generación de hidroeléctricas crean barreras para la dispersión natural de los peces, y eliminan las oportunidades de flujo genético entre poblaciones (Vrijenhoek 1998).

Los efectos de la sobrepesca en la abundancia de especies y diversidad están relativamente bien documentados, mientras que las amenazas a la diversidad genética de las poblaciones de peces han sido descuidadas en gran medida (Hauser et al. 2002). En muchas especies marinas el tamaño efectivo de la población (N_e), puede ser órdenes de magnitud más pequeñas que el tamaño de la población censal (N). Si tales proporciones bajas de N_e y N son comunes en especies marinas, muchas poblaciones de peces explotadas pueden estar perdiendo variabilidad genética (Hauser et al. 2002)..

Por su parte, la cuenca del río Lerma-Santiago ha experimentado una tremenda degradación a lo largo del siglo XX. Hacia 1985-93, sólo 15 % de los sitios eran todavía capaces de contener especies sensibles al medio en donde habitan, ya que los sitios restantes se encuentran altamente contaminados, mientras que algunos ya desaparecieron. Se deben de implementar medidas más drásticas sobre el manejo de desechos contaminantes e industriales y aguas negras, así como realizar un análisis de especies invasoras en el área; ya que un 40% de los peces nativos de la cuenca han sufrido importantes declives en su distribución e incluso varias especies podrían estar extintas actualmente. La extensión y magnitud de la degradación en la cuenca del río Lerma iguala o excede a los peores casos reportados en cuencas de tamaño comparable en cualquier otra parte del mundo. Esta dramática pérdida de biodiversidad se debe principalmente a la explosión de la población humana de México, de 15 millones de personas en 1910, hasta casi 105 millones en el fin de milenio, concentradas sobre todo en ciudades industrializadas, las cuales demandan una mayor cantidad de recursos naturales (Miller, 2009).

En el caso específico de *Chirostoma humboldtianum*, diversos autores han reportado la disminución del tamaño de sus poblaciones y la extirpación de la especie en algunas cuencas, como en el lago de Xochimilco y los lagos de las cuencas del Valle de México, como consecuencia de la explotación, introducción de especies exóticas (como es el caso de la Lobina), destrucción del hábitat, contaminación y eutroficación de los lagos en México (Álvarez, 1972; Barbour, 1973b; Barriga-Sosa et al., 2014; Lyons et al. 1998; García-Martínez et al., 2015). Sin embargo, el tamaño de la población de esta especie, y los tamaños efectivos poblacionales no ha sido determinados, por lo tanto la especie no ha sido ubicada dentro de las especies en peligro de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-Ecol-2010), ni en la lista roja IUCN por falta de información de la especie y del género en general. Para predecir un escenario de extinción a mediano y largo plazo, se requiere esfuerzos multidisciplinarios para integrar información evolutiva, genética, factores demográficos que afectan la dinámica de las poblaciones, además de incluir la estructura social y la variación de las historias de vida causada por fluctuaciones ambientales (Lande, 1998).

Es necesario estimar el tamaño efectivo de la población así como los tamaños mínimos viables de las poblaciones para identificar cuestiones demográficas poblacionales con datos genéticos y procesos de reclutamiento en las poblaciones con el fin de que exista un mayor tamaño efectivo poblacional (N_e) y como consecuencia una mayor probabilidad de reproducirse exitosamente (Lynch et al., 1998), además de proteger a esta especie de la explotación excesiva.

Realizar buenas prácticas de manejo en cautiverio, de especies en peligro de extinción, por ejemplo: conocer las relaciones de parentesco o *pedigrí* de las poblaciones en cautiverio para poder evitar la acción y los efectos de la endogamia ya que la endogamia puede reducir enormemente la aptitud reproductiva. Para mantener la variabilidad genética de los lotes es necesario introducir nuevo material genético (reproductores) o el intercambio de reproductores con otros centros acuícolas. El aumento del número efectivo de reproductores (Lopera-Barrero 2009; Freitas y

Galetti Jr, 2005) y la formación y manejo de diferentes lotes (de diferentes poblaciones) (Lopera-Barrero 2009; Porta et al., 2006). Adicionalmente una estrategia para la conservación de especies es la criopreservación de gametos, la cual se ha iniciado en la especie de estudio (Urbina-Sánchez, 2016). Estas estrategias permitirán un intercambio alélico seguro en las poblaciones cautivas y el mantenimiento de la diversidad genética dentro de la población, preservando la mayor variación en la poza génica. Lo anterior llevará a un correcto y exitoso desarrollo de la acuicultura y de la conservación en *Chirostoma humboldtianum*, la cual es una especie de valor social, ictiológico y económico.

Conclusiones

1. Se cumplieron los objetivos planteados en el presente estudio.
2. No se exhibieron mecanismos de aislamiento reproductivo durante el desarrollo temprano en las poblaciones analizadas en *C. humboldtianum*, ya que se obtuvo con éxito la progenie de la combinación de las poblaciones cautivas de Tiacaque y Tepuxtepec, aunque se observó una menor sobrevivencia en la F1 en comparación con las poblaciones silvestres, ésta baja sobrevivencia no es atribuible directamente a procesos derivados de aislamiento ya que los umbrales analizados en cada paso del desarrollo no impidieron la continuidad del desarrollo.
3. Se genotipificó con éxito a todos los individuos de las poblaciones silvestres y población en cautiverio (reproductores y F1).
4. Existe una baja diversidad genética y una fuerte estructura poblacional en las poblaciones silvestres, reproductores y F1, posiblemente por eventos de exogamia, endogamia, selección artificial, adaptación al cautiverio, el efecto fundador y posible deriva génica.
5. La cruce que aportó mayor número de individuos en este estudio fue Tiacaque ♀ X Tepuxtepec ♂ con un total de 48 peces juveniles, de los cuales la cruce de RT2 ♀ X RTx4 ♂ fue la que mostró mayor descendencia con 12 individuos.
6. Es importante tomar en cuenta la diversidad, estructura genética y relaciones de parentesco en las estrategias de manejo y conservación en *Chirostoma humboldtianum* con el fin de evitar extinciones locales en la especie y mantener la diversidad en poblaciones cautivas.

Bibliografía

- Aguirre-Planter E. 2007. Flujo Génico: Métodos para estimarlo y marcadores moleculares. En: Eguiarte et al., 2007, Ecología Molecular. Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAT, México.
- Aksnes, A., B. Hope, E. Jonsson, T.B. Björnsson and S. Albrektse. 2006. Size-fractionated fish hydrolysate as feed ingredient for rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fed high plant protein diets. I. Growth, growth regulation and feed utilization. *Aquaculture*. 261:305-317.
- Alarcón-Durán I, Castillo-Rivera MA, Figueroa-Lucero G., Arroyo-Cabrales J. y Barriga-Sosa IÁ. 2017. Diversidad morfológica en 6 poblaciones del pescado blanco *Chirostoma humboldtianum*. *Revista Mexicana de Biodiversidad*. 88 (2017) 207–214
- Alarcón-D. I.; Castillo-Rivera, M. A.; Arroyo-Cabrales, J. & Figueroa-Lucero, G. 2017. Cambios morfológicos en la ontogenia temprana de *Chirostoma riojai*. *Int. J. Morphol.*, 35(1):331-336
- Alaye, R. N. 1993. Hematología de Aterínidos de aguas dulces: Género *Chirostoma* spp. del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. *Ciencia Pesquera* 10: 97-109.
- Allendorf, F. W. & Utter, F. M. 1976. *Hereditas* 82, 19-24
- Aljanabi, S.M. & I. Martinez. 1997. Universal and rapid salt-extraction of high quality genomic DNA for PCR-based techniques. *Nucleic Acids Research* 25 (22): 4692–4693.
- Álvarez del Villar, J., Navarro, L. 1957. Los peces del Valle de México. Secretaría de Marina, Instituto Nacional de la Pesca, Dirección de Pesca e Industrias Conexas, México, D. F. 62 pp.
- Argüello-Guevara W., Bohorquez-Cruz M. Silva A. 2014. Malformaciones craneales en peces cultivados. *Latin American Journal of Aquatic Research. Lat. Am. J. Aquat. Res.*, 42(5): 950-962.
- Arnold SJ. 1995. Monitoring quantitative genetic variation and evolution in captive populations. In: *Population Management of Survival and Recovery*. Columbia University Press, New York
- Arnold, M.L. 1997. *Natural hybridization and evolution*. Oxford University Press, New York.
- Ayllon F., Davaine P., Beall E., Martinez J. L., Garcia-Vazquez E. 2004. Bottlenecks and genetic changes in Atlantic (*Salmo salar* L.) stocks introduced in the Subantarctic Kerguelen Islands. *Aquaculture* 237 (2004) 103– 116
- Avise, J. C., J. E. Neigel and J. Arnold. 1984. Demographic influences on mitochondrial DNA lineage survivorship in animal populations. *Journal Molecular and Evolution* 20: 99-723.
- Avise, J. 2000. *Phylogeography, the history and formation of species*. Harvard University Press. Londres, Inglaterra. 262-272, 327-340
- Badii, M.H., J. Landeros, R. Foroughbakhch y J.L. Abreu. 2007. Biodiversidad, evolución, extinción y sustentabilidad. *Daena: Internacional Journal of Good Conscience* 2(2): 229-247.
- Bailey G. S, Rusell. T. M., Polter adn Stockwell P. A. 1978. Gene duplication in tetraploid fish: Model for gene silencing at unlinked duplicated loci. Communicated by H. A. Barker. Department of Biochemistry, University of Otago, Dunedin, New Zealand. *Proc Natl. Acad Sci. USA*.
- Balon, E.K. 1985. The theory of saltatory ontogeny and life history models revisited. pp. 13-30. In: E.K. Balon (ed.) *Early Life Histories of Fishes: New Developmental, Ecological and Evolutionary Perspectives*, Dev. in Env. Biol. Fish. 5, Dr W. Junk Publishers, Dordrecht.
- Balon, E.K. 1986. Saltatory ontogeny and evolution. *Rivista di Biologia* 79: 151-190.
- Balon, E.K. 1989. The epigenetic mechanisms of bifurcation and alternative life-history styles. En: M.N. Bruton (ed.) *Alternative Life-History Styles of Animals, Perspectives in Vertebrate Science* 6, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- Balon, E.K. 1990. Epigenesis of an epigeneticist: the development of some alternative concepts on the early ontogeny and evolution of fishes. *Guelph Ichthyol. Rev.* 1: 1-42.
- Bamber, R. N. y Henderson, P. A. 1988. Preadaptive plasticity in atherinids and the estuarine seat of

- teleost evolution. *Journal of Fish Biology*, 33, 17–23.
- Barbour, C. D. 1973a. The systematics and evolution of the genus *Chirostoma* Swainson (Pisces, Atherinidae). *Tulane Studies in Zoology and Botany*, 18, 97–114.
- Barbour, C. D. 1973b. A biogeographical history of *Chirostoma* (Pisces: Atherinidae): a species flock from the Mexican Plateau. *Copeia*, 3, 533–556.
- Barbour, C. D. and Chernoff, B. 1984. Comparative morphology and morphometrics of the pescados blancos (genus *Chirostoma*) from Lake Chapala, México. En A. A. Echelle e y I. Kornfield (Eds.), *Evolution of fish species flocks*. Orono: University of Maine.
- Barriga-Sosa, I. A. 2001. Variabilidad morfométrica, merística y molecular de especies del género *Chirostoma* (Pisces: Atherinopsidae). Tesis de Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México.
- Barriga-Sosa, I. A. Ibañez-Aguirre I. y J. I. Arredondo-Figueroa JL. 2002. Morphological and genetic variation in seven species of the endangered *Chirostoma humboldtianum* species group (Atheriniformes: Atherinopsidae). *Revista de Biología Tropical* 50 (1): 199-216.
- Barriga Sosa, I A. 2003. La importancia de los estudios de genética molecular en el género *Chirostoma*. Laboratorio de Genética. Planta Experimental de Producción Acuícola. Depto. de Hidrobiología. División de CBS. UAM-I.
- Barriga-Sosa, I. A. Eguiarte, L.E., Arredondo-Figueroa, J.L., 2004. Low but significant subdivision among populations of *Chirostoma gandocule* from Lake Patzcuaro, Mexico. *Biotropica* 36 (1), 85–98.
- Barriga-Sosa, I. A. Pérez-Ramírez F, Soto-Aguirre M. Castillo-Rivera, Arredondo-Figueroa JL. 2005. Interspecific variation of the mitochondrial r16S gene among silversides, “Peces Blancos”, (Atherinopsidae: *Menidiinae*) and its utilization for species identification. *Aquaculture* 250: 637-651.
- Barriga-Sosa I. A. Francisco J. García De León F. J, y Del Río-Portilla M. A. 2014. The complete mitochondrial DNA of the endemic shortfin silverside, *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes, 1835). Mitogenome announcement. <http://informahealthcare.com/mdn> ISSN: 1940-1736 Mitochondrial DNA, Early Online: 1–2 2014 Informa UK Ltd. DOI: 10.3109/19401736.2014.953130
- Barriga-Sosa I. A. García-Martínez R. M., Díaz-Larrea J., Lozano Garza O. A., García-De-León F. J. 2014. Isolation and Characterization of 26 Microsatellite *Loci* for the Shortfin Silverside Fish *Chirostoma humboldtianum* Valenciennes 1835 (Atherinopsidae: Menidiinae) Derived from Next Generation Sequencing and Their Cross-Amplification in Central Mexican Atherinopsids. *Open Journal of Genetics*, 2014, 4, 355-361.
- Barriga-Sosa I. A., Arredondo-Figueroa J. L., Ingle de la Mora G., García-de León F. J. 2016. Estrategias acuícolas para la conservación de trucha nativa: primeras experiencias. En la trucha dorada mexicana En: Ruiz-Luna A. García-de León F. J.. Editores: CONACYT CIAD, CIB. isbn: 978-607-7900-26-9
- Beebe S, et al. 2000. Structure of genetic diversity among common bean landraces of Middle American origin based on correspondence
- Bernal-Ramírez, J. & Adcock, Greg & Hauser, Lorenz & Carvalho, Gary y Smith, Peter. 2003. Temporal stability of genetic population structure in the New Zealand snapper, *Pagrus auratus*, and relationship to coastal currents. *Marine Biology*. 142. 567-574. 10.1007/s00227-002-0972-9.
- Betancur-R, R., G. Ortí, A. M. Stein, A. P. Marceniuk, and R. Alexander Pyron. 2012. Apparent signal of competition limiting diversification after ecological transitions from marine to freshwater habitats. *Ecol. Lett.* 15:822–830.
- Blancas-Arroyo G, Figueroa-Lucero G, Barriga-Sosa I. A. y Arredondo-Figueroa J. L. 2003 Primeras experiencias sobre el manejo de reproductores de Pez Blanco (*Chirostoma humboldtianum*

- Valenciennes, 1935) bajo condiciones controladas. Memorias del II Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura CIVA 2003; 2003 agosto-febrero 2004; Universidad de Zaragoza, España: Universidad de Zaragoza, Agosto 2003:30-42. Disponible en: <http://www.revistaaquatic.com/civa2003/coms/lis-tado.asp?cod=38>
- Blancas-Arroyo, G.A., Figueroa-Lucero, G., Barriga-Sosa, I. A., Arredondo-Figueroa, J. L., 2004. Effects of an artificial photothermal cycle on the reproduction of the shortfin silverside, *Chirostoma humboldtianum*, Valenciennes, 1835 (Pisces: Atherinopsidae). *Aquaculture* 241, 575–585.
- Blancas Arroyo GA, Barriga Sosa I. A., Morato Cartagena T., Ramírez M C. R., y Arredondo Figueroa J. L. 2008. Desarrollo ovárico y su relación con las concentraciones séricas de 17 β -estradiol y 17 α -hidroxi- 4-pregnen-3-ona en hembras de primera maduración de pez blanco, *Chirostoma humboldtianum* (Atheriniformes: Atherinopsidae) *Vet. Méx.*, 39 (1) 2008
- Bloom, D. D., Weir, J. T., Piller, K. R. y Lovejoy, N. R. 2013. Do freshwater fishes diversify faster than marine fishes? A test using state-dependent diversification analyses and molecular phylogenetics of new world silversides (Atherinopsidae). *Evolution*, 67, 2040–2057.
- Bradbury, J. P. 1971. Paleolimnology of Lake Texcoco, Mexico evidence from diatoms. *Limnol. Oceanogr.* 16:180–200.
- Bürger R. & Lynch M. 1994. Evolution and extinction in changing environment: a quantitative- genetic analysis. *Evolution* 49:151-163.
- Cahu, C., J. Zambonino-Infante & T. Takeuchi. 2003. Nutritional components affecting skeletal development in fish larvae. *Aquaculture*, 227: 245-258
- Campanella D., Hughes L.C., Unmack P.J., Bloom D. D., Piller K. R., Ortí G. 2005. Multi-locus fossil-calibrated phylogeny of Atheriniformes (Teleostei, Ovalentaria). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, ISSN 1055-7903, <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2015.03.001>.
- Cárdenas R. R. 2003. Cultivo de pez blanco *Chirostoma humboldtianum*. Consideraciones para su producción. En: Rojas CP, Fuentes CD, editores. Historia y avances del cultivo de pescado blanco. México DF; Instituto Nacional de la Pesca, 2003:191-210.
- Castillo Cobián A. 2007. La selección natural a nivel molecular. En: Eguiarte et al., 2007, *Ecología Molecular*. Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAT, México
- Castellanos-Morales G. 2009. El efecto de la fragmentación en la variabilidad genética de los perros llaneros (*Cynomys ludovicianus*) en Janos – Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, México
- Castellanos- Morales G, Gasca-Pinead J. Ceballos G y Ortega J. 2014 Genetic variation in a perioheral and declining black- tailed prairie dig (*Cynomys ludovicianus*) population for Mexico. *Journal of Mammalogy* 95(3):467-479
- Castro-Ruiz D., Querouil S., Baras E. , Chota-Macuyama W, Duponchelle F., Nuñez J. Renno J-F, García-Dávila C. 2009. Determinación de parentesco en larvas de *Pseudoplatystoma fasciatum* (Linnaeus, 1766) producidas en cautiverio. Instituto de investigaciones de la amazonía peruana.
- Castro, J.; Pino, A.; Herminda, M.; Bouza, C.; Riaza, A.; Ferreira, I.; Sánchez, L.; Martínez, P. 2006. A microsatellite marker tool for parentage analysis in Senegal sole (*Solea senegalensis*): Genotyping errors, null alleles and conformance to theoretical assumptions. *Aquaculture*, 261:1194-1203
- Chacón, F.A., Rosas, M.C. 1995. A restoration plan for pez blanco in lake Patzcuaro, Mexico. *Uses and effects of culture fishes in aquatic ecosystems. American Fisheries Society* 15, 122–126.
- Chacón, F.A., Rosas, M.C., Segura, G.V. 2003. Biología Reproductiva y alimentación del pez blanco en condiciones experimentales. Historia y avances del cultivo de pescado blanco. Instituto Nacional de la Pesca, Dirección General de Investigación en Acuicultura, México, pp. 125–139.
- Chapuis MP, Estoup A. 2007. Microsatellite null alleles and estimation of population differentiation. *Molecular Biology and Evolution*, 24, 621-631

- Chávez-Toledo, C. 1987. Ictiofauna del Alto Lerma; aspectos sistemáticos, zoogeográficos y ecológicos. Tesis de Licenciatura. Biólogo. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. México. 51 pp.
- Cockerham, C. C. 2002. Variance of gene frequency. *Evolution*, v.23, n.1, p.72-74, 1969
- Cornuet J-M and Luikart G. 1996. Description and power analysis of two tests for detecting recent population bottlenecks from allele frequency data. *Genetics* 144: 2001–2014.
- Crow, J.F. y M. Kimura. 1970. An introduction to population genetic theory. Harper & Row. Nueva York.
- Darwin, C. R. 1859. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. London: John Murray. (1st edition)
- Díaz-Pardo E, Godínez-Rodríguez M. A. López-López E., Soto-Galera E. 1993. Ecología de los peces de la cuenca del río Lerma, México. *Anuales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN México*. 1993; 39:103
- Díaz- Pardo, E. 1986. Requerimientos ecológicos de peces atherinidos. Resúmenes del 1 Congreso de la Asociación Mexicana de Acuiculturista. Mexico, D. F.
- DI Rienzo, A. 1994. Mutational processes of simple sequence repeat loci in human populations. *Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America*, v.91, n.8, p.3166-3170, 1994.
- Defaveri, J., Shikano, T., Shimada, Y., Goto, A., and Merilä, J. 2011. Global analysis of genes involved in freshwater adaptation in threespine sticklebacks (*Gasterosteus aculeatus*). *Evolution*, 65(6), 1800–1807. <https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2011.01247>.
- Del Río. G. S. 2004. Efectos de la densidad sobre el crecimiento y la sobrevivencia de *Chirostoma humboldtianum* (Valencines) Atheriniformes: Atherinopsidae) durante el desarrollo temprano. Tesis de Licenciatura, Instituto Politécnico Nacional, Escuela de Ciencias Biológicas. México.
- Dobzhansky T, Ehrman L, Kastritsis P. 1968. Ethological isolation between sympatric and allopathic species of the Obscura group of *Drosophila*. *Anim Behav*. 1968;16:79-87
- Dobzhansky, T. 1964. Genetics and the origin of species. Columbia University Press. Nueva York, Estados Unidos de América. 364p
- Doebley JF. 1992. Molecular systematics and crop evolution. In: Soltis PS, Soltis DE, Doyle JJ., editors. *Molecular systematics of plants*. New York: Chapman and Hall.
- Dolman G, Moritz C. 2006. A multilocus perspective on refugial isolation and divergence in rainforest skinks (*Carlia*). *Evolution* 60:573–82
- Dowling Thomas E. & Secor Carol L. 1997. The Role of Hybridization and Introgression in the Diversification of Animals. *Annual Review of Ecology and Systematics* 593-619 10.1146/annurev.ecolsys.28.1.593
- Dyer, B. S. y Chernoff, B. 1996. Phylogenetic relationships among atheriniform fishes (Teleostei: Atherinomorpha). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 117, 1–69.
- Earl, Dent & Vonholdt, Bridgett. 2012. Earl DA, VonHoldt BM.. Structure Harvester: a website and program for visualizing STRUCTURE output and implementing the Evanno method. *Cons Genet Res* 4: 359-361. *Conservation Genetics Resources*. 4. 1-3. 10.1007/s12686-011-9548-7.
- Echelle, A. A. y Echelle, A. F. 1984. Evolutionary genetics of a “species flock”: atherinid fishes of the Mesa Central Mexico. En A. A. Echelle y I. Konfield (Eds.), *Evolution of fish species flocks* (pp. 93–110). Orono: University of Maine.
- Echelle AA, Schwemm MR, Lang NJ, Nagle BC, Simons AM. 2014. Molecular systematics and historical biogeography of the *Nocomis biguttatus* species group (Teleostei: Cyprinidae): Nuclear and mitochondrial introgression and a cryptic Ozark species. *Mol Phylogenet Evol*. 2014;81:109-11.
- Eguiarte LE. 1986. Una guía para principiantes a la Genética de Poblaciones. Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 001. 30-38

- Eguiarte L., Souza V., Aguirre X. 2007. Ecología Molecular, Instituto Nacional de Ecología, Semarnat, México.
- Eguiluz Moya L. M. 2014. Identificación de marcadores microsatélites para el estudio de la diversidad genética de *Taenia solium*. Tesis para optar el grado de magister en bioquímica y biología molecular. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Peru.
- Evanno, G.; Regnaut, S.; Goudet, J. 2005. Detecting the number of clusters of individuals using the software Structure: a simulation study. *Molecular Ecology*, v.14, n.8, p.2611-2620, 2005.
- Excoffier, L. & H. E. L. Lischer. 2010. Arlequin suite ver 3.5: a new series of programs to perform population genetics analyses under Linux and Windows. *Molecular Ecology Resources* 10 (3): 564-567.
- Figueroa-Lucero, G., Hernández-Rubio, M.C., Rios, B.G., Sevilla, H.M.L. 1999. Biensayos de alimentación en alevines de *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes) (Pisces: Atherinidae), bajo condiciones de laboratorio. *Anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas* 45, 17-23.
- Figueroa-Lucero, G., Meza, G.O., Hernández, R.M.C., Barriga S., I. A., Rodríguez, C.A., Arredondo, F.J.L., 2004a. Growth, survival and mandible development in the larvae of the shortfin silverside *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes) (Atheriniformes: Atherinopsidae) under laboratory conditions. *Aquaculture* 242, 689-696.
- Figueroa-Lucero, G., Hernández, R.M.C., Meza, G.O.R., Arredondo, F.J.L., Castro, B.T., Barriga S., I. A., Rodríguez, C.A., 2004b. Effect of food type on growth and survival of *Chirostoma riojai* Solórzano y López, 1965 (Atheriniformes: Atherinopsidae) during early development. *Journal of Biological Research* 2, 93-99.
- Frankel, O.H. 1970. Variation, the essence of life. Sir William Macleay Memorial Lecture. *Proceeding of the Linnean Society NSW* 95:158-169.
- Frankel, O.H. 1974. Genetic conservation: our evolutionary responsibility. *Genetics* 78:53-65.
- Frankham, R., Ballou, J.D., Briscoe, D.A. 2002. *Introduction to Conservation Genetics*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Frankham R., Ballou J.D., Briscoe, D.A. 2004. *A Primer of Conservation Genetics*. 10.1017/CBO9780511817359.
- Frankham, R. 2005. Genetics and extinction. *Biological conservation* 126: 131-140.
- Frankham R. 2008. Genetic adaptation to captivity in species conservation programs. *Mol Ecol.* 17:325-333
- Frankham R, Ballou JD, Briscoe, Mclnnes HK. 2009. *Introduction to conservation genetic*. Cambridge University Press, London
- Franklin I. R & Frankham R. 1998. How large must population be to retain evolutionary potential? *Anim. Conserv.* 1:69-70
- Franklin, I.R. Evolutionary change in small populations. 1980. En: Soule, M.E.; Wilcox, B.A. editor/s. *Conservation Biology - An evolutionary-ecological perspective*. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, U.S.A.; 1980. 135-149
- Fraser, D. J., A. L. S. Houde, P. V. Debes, P. O'Reilly, J. D. Eddington, y Hutchings J.A. 2010. Consequences of farmed-wild hybridization across divergent wild populations and multiple traits in salmon. *Ecological Applications* 20:935-953
- Freitas PD y Galetti Jr PM. 2005. Assessment of the genetic diversity in five generations of a commercial broodstock line of *Litopenaeus vannamei* shrimp. *Afr J Biotechnol* 4:1362-1367.
- Ferris, S. D. & Whitt, G. S. 1977. *Biochem. Genet.* 15, 1097-1112.
- Frommen JG, Luz C, Mazzi D, Bakker TCM. 2008. Inbreeding depression affects fertilization success and survival but not breeding coloration in threespine sticklebacks. *Behaviour* 2008;145:425-441.

- Fu, Y. X. 1997. Statistical test of neutrality of mutations against population growth, hitchhiking and background selection. *Genetics* 147 (2):915-925.
- Fuller, R. C., K. E. McGhee, and M. Schrader. 2007. Speciation in killifish and the role of salt tolerance. *J. Evol. Biol.* 20:1962–1975
- Futuyma, D. 1986. *Evolutionary biology*. 2a. ed. Sinauer Associates Inc. Sunderland. Massachusetts.
- Gallardo JA, Neira R. 2005. Environmental dependence of inbreeding depression in cultured Coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*): aggressiveness, dominance and in-traspecific competition. *Heredity* 2005;95:449–456.
- García Martínez R. M. 2014. Análisis filogeográfico del pez blanco *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes, 1835) (Pisces: Atheriniformes: Atherinopsidae) Tesis de doctorado. UAM-I. 2015.
- García-Martínez, R.M., García De León, F.J., Mejía, O. and Barriga Sosa, I. A. 2014. Isolation and Characterization of Microsatellite Loci in the “Charal de Xochimilco” *Chirostoma humboldtianum*. *Revista Mexicana de Biodiversidad*
- García-Martínez RM, Mejía O, García de león F. J. y Barriga- Sosa I. A. 2015. Extreme genetics divergence in the endemic fish *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes, 1835): implications for its conservation. *Hidrobiológica* 25 (1): 13-18
- Gardner, M. G., Fitch, A. J., Bertozzi, T., & Lowe, A. J. 2011. Rise of the machines recommendations for ecologists when using next generation sequencing for microsatellite development. *Molecular Ecology Resources*, 11(6), 1093–1101. <https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2011.03037.x>
- Gapasin, R.S.J. & M.N. Duray. 2001. Effects of DHA-enriched live food on growth, survival and incidence of opercular deformities in milkfish (*Chanos chanos*). *Aquaculture*, 193: 49-63.
- Georgakopoulou, E., P. Katharios, P. Divanach & G. Koumoundouros. 2010. Effect of temperature on the development of skeletal deformities in gilthead seabream (*Sparus aurata* Linnaeus, 1758). *Aquaculture*, 308: 13-19.
- Georgakopoulou, E., A. Angelopoulou, P. Kaspiris, P. Divanach & G. Koumoundouros. 2007. Temperature effects on cranial deformities in European sea bass, *Dicentrarchus labrax* (L.). *J. Appl. Ichthyol.*, 23: 99-103.
- Gillespie J. H. 2004. *Population Genetics*, The Johns Hopkins University Press All rights reserved.
- Gordon d, Abajain C, Green P. 1998. Consed: A graphical tool for sequence finishing. *Genome Research*, 8, 195-202.
- Guitierrez Guerrero Y. T. 2014. Efecto del cautiverio sobre la diversidad genetica de una población de perrito de la pradera mexicano (*Cynomys mexicanus*). Tesis. Facultad de Ciencias, UNAM
- Hancock, J. M. 1999. Microsatellites and other simple sequences: genomic context and mutational mechanisms. In: Goldstein, D. B & Schlöterer, C. (eds.). *Microsatellites. Evolution and applications*. Oxford University Press. New York: 1-9.
- Hamilton MB. 2009. *Population genetics*. Edit. Wiley-Blackwell, Malaysia. pp 68-73, 105-149 y 235-281
- Hara, M.Sekino, M. 2003. Efficient detection of parentage in a cultured Japanese flounder *Paralichthys olivaceus* using microsatellite DNA marker. *Aquaculture* , 217: 107-114.
- Hartl, D.L. and Clark, G.C. 1997. *Principles of Population Genetics*. Sinauer Associates, Sunderland.
- Harbicht A., Wilson C. C., and Fraser D. J. 2014. Does human-induced hybridization have long-term genetic effects? Empirical testing with domesticated, wild and hybridized fish populations. *Evolutionary Applications* ISSN 1752-4571. doi:10.1111/eva.12199
- Hauser L. Adcock G. J, Smith, Bernal Ramirez H., Carvalho G. R. 2002. Loss of microsatellite diversity and low effective population size in an overexploited population of New Zealand snapper (*Pagrus auratus*). Edited by John C. Avise, University of Georgia, Athens, GA, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.172242899
- Hedrick, PW. 2005. *Population Genetics*. Jones and Bartlett Publishers, Massachussets, EUA.

- Herlin, M.; Taggart, J.B.; McAndrew, B.J.; Penman, D.J. 2007. Parentage allocation in a complex situation: a large commercial Atlantic cod (*Gadus morhua*) mass spawning tank. *Aquaculture*, 272: 195-203.
- Hernández-Rubio, M. C., Figueroa-Lucero, G., Barriga-Sosa, I. D. L. A., Arredondo-Figueroa, J. L. y Castro-Barrera, T. 2006. Early development of the shortfin silverside *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes, 1835) (Atheriniformes: Atherinopsidae). *Aquaculture*, 261, 1440–1446.
- Hernández-Rubio, M.C. 2009. Historia de vida temprana de *Chirostoma humboldtianum* y *Chirostoma riojai* (Atheriniformes: Atherinopsidae) bajo la teoría de la ontogenia por saltos. Tesis de doctorado. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. de México
- Hilborn, R. & Walters, C. J. 1992. Quantitative Fisheries Stock Assessment Choice, Dynamics and Uncertainty (Chapman & Hall, London).
- Hoelzel A.R., J. Halley, S.J. O'Brien, C. Campagna, T. Arnborn, B. Le Boeuf, K. Ralls y G.A. Dover. 1993. Elephant seal genetic variation and the use of simulation models to investigate historical population bottlenecks. *J. Heredity* 84:443.
- Hollingsworth, P. R., and T. J. Near. 2009. Temporal patterns of diversification and microendemism in eastern highland endemic barcheek darters (Percidae: *Etheostomatinae*). *Evolution* 63:228–243.
- Hubbs Clark and Drewry George E. 1959. Artificial Production of an Intergeneric Atherinid Fish Hybrid *Copeia*, Vol. 1959, No. 1 (Apr. 17, 1959).
- Israde-Alcántara, I. 1997. Neogene diatoms of Cuitzeo lake central sector of the Trans-Mexican Volcanic Belt and their relationship with the volcano-tectonic evolution. *Quaternary International* 43/44: 137-143.
- Jerry D. R., Preston N. P., Crocos P. J, Keys S, Meadows J. R. S., Yutao Li. 2004. Parentage determination of Kuruma shrimp *Penaeus japonicus* (Marsupenaeus) using microsatellite markers (Bate). *Aquaculture* 235 (2004) 237–247
- Jones FC, Grabherr MG, Chan YF, Russell P, and Mauceli E. 2012. The genomic basis of adaptive evolution in threespine sticklebacks. *Nature*.484:55–61.
- Kalinowski, S. T. & Waples, R. S. 2006. *Conserv. Biol.* 16, 129–136.
- Kimura, M. 1968. Evolutionary rate at the molecular level. *Nature* 217(129):624-626
- Kimura. M. 1983. The neutral theory of molecular evolution. Cambridge University Press. Cambridge.
- Kimura, M.; Crow, J. F. 1964. The number of alleles that can be maintained in a finite population. *Genetics*, v.49, n.4.
- Keck, B. P., and T. J. Near. 2010. A young clade repeating an old pattern: diversity in *Nothonotus darters* (Teleostei: Percidae) endemic to the Cumberland River. *Mol. Ecol.* 19:5030–5042.
- Kouttoui, S.; Georgakopoulou, E.; Kaspiris, P.; Divanach, P. & Koumoundouros, G. 2006. Shape ontogeny and variation in the sharpnout seabream, *Diplodus puntazzo* (Cetti 1777). *Aquac. Res.*, 37(7):655-63.
- Koch M. Hadfield J. D. Sefc K. M and Sturmbauer C. 2008. Pedigree reconstruction in wild cichlid fish populations. *Molecular Ecology* 17, 4500–4511. doi: 10.1111/j.1365-294X.2008.03925.x
- Lande, R. 1988. Genetics and demography in biological conservation. *Science* 241, 1455–1460.
- Lande, R., 1995. Mutation and conservation. *Conservation Biology* 9,782–791.
- Leberg, P. L. 1991. Effects of genetic variation on the growth of fish populations: Conservation Implications. *Journal of Fish Biology* 37 (Suppl. A), 193–195.
- Leidy, R.A. & Moyle, P.B. 1998. Conservation status of the world's fish fauna: an overview. *Conservation Biology: The Coming Decade*, pp. 187–227. Chapman & Hall, New York
- Li CC, Weeks DE, Chakravarti. 1993. Similarity of DNA fingerprints due to chance and relatedness. *Hum Hered.* 43:45-52
- Lim, S. T. & Bailey, G. S. 1977. *Biochem. Genet.* 15, 707-721

- Liu, Z.J. and Cordes, F.J. 2004. DNA marker technology and their applications in aquaculture genetics. *Aquaculture*, 238, 1-37. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2004.05.027>
- Lopera-Barrero M. N., Pereira-Ribeiro R., Aparecido Povh J., Vargas L., Bessalho Jacometo C., Gomes C. 2009 Genetic diversity in *Piaractus mesopotamicus* stocks used in stock enhancement programs and implications for conservation. *Agrociencia* 43: 249-256. 2009
- Luikart G, Cornuet JM. 1998. Empirical evaluation of a test for identifying recently bottlenecked populations from allele frequency data. *Conserv Biol* 12:228–237
- Lynch M, Blanchard J, Houle D, Kibota T, Schultz S, Vassilieva L, Willis J. 1999. Spontaneous deleterious mutation. *Evolution*, 53,645–663.
- Lynch M, Conery J, Bürger R. 1995. Mutation accumulation and the extinction of small populations. *American Naturalist*, 146, 489–518.
- Lynch, M., Walsh, B., 1998. *Genetics and Analysis of Quantitative Traits*. Sinauer, Sunderland, MA.
- Lynch, M., Buanrger, R., Butcher, D., Gabriel, W. 1993. The mutational meltdown in asexual populations. *Journal of Heredity* 84, 339–344.
- Lynch M & O'Hely M. 2001. Captive breeding and the genetic fitness of natural populations. Department of Biology, University of Oregon, Eugene, Oregon 97403, USA *Conservation Genetics* 2: 363–378, 2001. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands
- Lynch, J. D. 1989. The gauge of speciation: on the frequencies of modes of speciation. in D. Otte and J. A. Endler, eds. *Speciation and its consequences*. Sinauer Associates, Sunderland, MA.
- Lyons F., Mickelson R., Kristin J. L. Sullivan, Coyne M., James. 1998. Coping as a Communal Process. *Journal of Social and Personal Relationships*. 15. 10.1177/0265407598155001. Miller, 2009
- Mallet J. 2005. Hybridization as an invasion of the genome. *Trends Ecol Evol*. 2005;20:229-37
- Mayr E. 1989. Speciation evolution or punctuated equilibria. *J Soc Biol Struct*. 1989;12:137-15
- Martínez Palacios, C.A., Tovar, E.B., Taylor, J.F., Duran, G.R., Ross, L.G. 2001. Effect of temperature on growth and survival of *Chirostoma estor estor*, Jordan 1879, monitored using a simple video technique for remote measurement of length and mass of larval and juvenile fishes. *Aquaculture* 209, 369–377.
- Macpherson, E. 1998. Ontogenetic shifts in habitat use and aggregation in juvenile sparid fishes. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.*, 220(1):127-50.
- McCauley, D.E. 1995. The use of chloroplast DNA polymorphism in studies of gene flow in plants. *Trends in Ecology and Evolution* 10:198-202
- Miller, R. R. 1966. Geographical distribution of Central American freshwater fishes. *Copeia*, 1966, 773–802.
- Miller, R. R. y Smith, M. L. 1986. Origin and geography of fishes of Central Mexico. En C. H. Hocutt y E. O. Wiley (Eds.), *The zoogeography of North American freshwater fishes* (pp. 487–517). New York: Wiley.
- Miller, R. R., W. L. Minckley and S. M. Norris. 2005. *Freshwater Fishes of México*. The University of Chicago Press. Chicago. 490 p.
- Milligan BG. 2003. Maximum-likelihood estimating of relatedness. *Genetics*. 163:1153-1167
- Meirmans PG. 2012. Amova-Based Clustering of Population Genetic Data. *Journal of Heredity*;103(5):744–750.
- Morales Ventura, J., Nandini, S., Sarma, S.S. 2004. Functional responses during the early larval stages of the charal fish *Chirostoma riojai* (Pisces: Atherinidae) fed rotifers and cladocerans. *Journal of Applied Ichthyology* 20, 417–421.
- Mortiz C. 1994. Defining “Evolutionary significant Units” for conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 9(10): 373-375
- Moncayo-Estrada, R., I. Israde-Alcántara & V. H. Garduño-Monroy. 2001. La cherehuita *Hubbsina*

- Turneri De Buen (1941) (Pisces: Goodeidae). Origen, distribución y uso de la regionalización de la cuenca del Lerma. *Hidrobiológica* 11(1): 1-18.
- Monson CA, Sadler KC. 2010. Inbreeding depression and outbreeding depression are evident in wild-type zebrafish lines. *Zebrafish*. doi: 10.1089/zeb.2009.0648. PubMed PMID: 20438386; PubMed Central PMCID: PMC2946628.
- Moore, B. R., and M. J. Donoghue. 2007. Correlates of diversification in the plant clade dipsacales: geographic movement and evolutionary innovations. *Am. Nat.* 170:S28–S55.
- Moore, B. R., and M. J. Donoghue. 2009. A Bayesian approach for evaluating the impact of historical events on rates of diversification. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 106:4307–4312.
- Moyle, Peter & Leidy, Robert. 1992. Loss of Biodiversity in Aquatic Ecosystems: Evidence from Fish Faunas. 10.1007/978-1-4684-6426-9_6.
- Nakadate M, Takahito S, Nobuhiko T. 2003. Inbreeding depression and heterosis in various quantitative traits of the guppy, *Poecilia reticulata*. *Aquaculture* 2003;220:219–226.
- Navarrete, S. N. A., y Cházaro, O. S. 1992. Espectro trófico del charal *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes) Pisces Atherinidae del embalse San Felipe Tiacaque, Estado de México. *Rev. Zool.* 3: 28-34.
- Nelson, J. S., Grande, T. C. y Wilson, M. V. H. 2016. *Fishes of the world* (5th Ed). New Jersey: Wiley.
- Nei M. 1973. Analysis of gene diversity in subdivided populations. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA.* 70:3321–3323.
- Nei, M. 1975. *Molecular Population Genetics and Evolution*. Amsterdam: North Holland Publishing.
- Nolan C. Kane and Matthew G. King. 2009. Using parentage analysis to examine gene flow and spatial genetic structure. *Molecular Ecology* 18, 1551–1552
- Ohta, T. 1992. The nearly neutral theory of molecular evolution. *Ann Rev Ecol Syst* 23:263–286.
- Ohta, T.; Kimura, M. 1973. A model of mutation appropriate to estimate the number of electrophoretically detectable alleles in a finite population. *Genetic Research*, v.33, p.201-204, 1973
- Oster, G. & P. Alberch. 1982. Evolution and bifurcation of developmental programs. *Evolution* 36: 444–459.
- Paulo-Maya, J., Figueroa, L.G., Soria, B.M., 2000. Peces dulceacuícolas mexicanos XIX *Chirostoma humboldtianum* (Atheriniformes: Atherinopsidae). *Zoología Informa*, vol. 3. ENCB, IPN, México, pp. 59–74.
- Plath, M., B. Hermann, C. Schroder, R. Riesch, M. Tobler, F. J. G. de Leon, I. Schlupp, and R. Tiedemann. 2010. Locally adapted fish populations maintain small-scale genetic differentiation despite perturbation by a catastrophic flood event. *BMC Evol. Biol.* 10:256.
- Ponce Palafox JT, Ruiz Luna A, García-Ulloa Gómez M. Flores Verdugo FJ., Chávez Ortiz EA Melo García MA, Riesgos de la acuicultura sobre la diversidad biológica: Latinoamérica. En *Acuicultura en México: Impacto, en Producción, Manejo y conservación*. Editorial Académica española.
- Pritchard, J.; Stephens, M.; Donnelly, P. 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data. *Genetics*, v.155, n.2, p.945-959, 2000.
- Queller DC, Goodnight KF. 1989. Estimating relatedness using molecular markers. *Evolution.* 43:258-275
- R Core Development Team. 2013. R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <http://www.R-project.org>.
- Rails K. and J. D. Bailou. 1986. Eds. *Zoo Biol.* 5 (no. 2 entire issue)
- Ramírez-Sevilla R. 2006. Biología reproductiva y ontogenia de *Chirostoma humboldtianum* (Valenciennes 1835) (Pisces: Atherinopsidae) en condiciones de laboratorio. Tesis de Doctorado. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN.

- Ribera, I., T. G. Barraclough, and A. P. Vogler. 2001. The effect of habitat type on speciation rates and range movements in aquatic beetles: inferences from species-level phylogenies. *Mol. Ecol.* 10:721–735.
- Ricker, W.E. 1975. *Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations*. Department of the Environment Fisheries and Marine Service. Ottawa, Canada. 401 p.
- Rindos, D. 1984. *The origins of agriculture*. Orlando, FL: Academic Press.
- Ritland, K. 1996. Estimators for pairwise relatedness and individual inbreeding coefficients. *Genetical Research*, 67(2), 175-185. doi:10.1017/S0016672300033620
- Raymond M y Rousset F. 1995. GENPOP v. 1.2: population genetics software for exact test and ecumenicism. *Journal of Heredity* 86:248-249.
- Rodríguez-Pulido J. A., Cruz-Castallas P. E., Góngora Ojuela A. 2016. Hibridación de silúridos: una alternativa para la piscicultura con alto riesgo para la conservación de las especies nativas ORINOQUIA - Universidad de los Llanos - Villavicencio, Meta. Colombia Vol. 20 - No 1.
- SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería y desarrollo Rural. Pesa y Alimentación). 2017. México como una potencia en producción acuícola. La Paz, Baja California Sur, 15 de abril de 2017.
- Rousset, 1995. “GENEPOP Version 1.2: Population Genetics Software for Exact Tests and Ecumenicism.” *J. Hered.* 86: 248–49.
- Rubinoff Ira. 1961. Artificial Hybridization of Some Atherinid Fishes *Copeia*, Vol. 1961, No. 2, pp. 242-244 Published by: American Society of Ichthyologists and Herpetologists
- SAGARPA (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural). 2017. Produce acuicultura mexicana más de 400 mil toneladas de pescados y mariscos. Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. 27 de agosto de 2018, Ciudad de México, México.
- SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2010, Segunda Sección, México.
- Selkoe KA y Toonen RJ. 2006. Microsatellites for ecologists: a practical guide to using and evaluating microsatellite markers. *Ecology Letters* 9:615-629.
- Sonnante G, Stockton T, Nodarir O, Becerra-Velásquez VL, Gepts P. 1994. Evolution of genetic diversity during domestication of *Phaseolus vulgaris*. *Theor Appl Genet.* 1994;89:629–35
- Soucy S. & Travis J. 2003. Multiple paternity and population genetic structure in natural populations of the poeciliid fish, *Heterandria Formosa*. Department of Biological Science, Florida State University, Tallahassee, FL, USA. *J. EVOL. B IOL.* 16 (2003) 1328–1336
- Soulé M. 1985. What is conservation biology? A new synthetic discipline addresses the dynamics and problems for perturbed species, communities and ecosystems. *BioScience* 35(11):727-734
- Stiassny Shirai, 1996. Phylogenetic interrelationships of Neoselachians (Chondrichthyes: Euselachii). p. 9-34. In M. Stiassny, L. Parenti and G. Johnson (eds.) *Interrelationships of fishes*. Academic Press, New York.
- Sunnucks P. 2000. Efficient genetic markers for population biology. *Trends in Ecology and Evolution* 15:199-203
- Tautz D, Renz M. 1984. Simple sequences are ubiquitous repetitive components of eukaryotic genomes. *Nucleic Acids Research*, 12, 4127– 4139.
- Templeton, A.R. 2004. Statistical phylogeography: methods of evaluating and minimizing inferences errors. *Molecular Ecology* 13:789-809.

- Tobler, M., T. J. DeWitt, I. Schlupp, F. J. G. de Leon, R. Herrmann, P. G. D. Feulner, R. Tiedemann, and M. Plath. 2008. Toxic hydrogen sulfide and dark caves: phenotypic and genetic divergence across two abiotic environmental gradients in *Poecilia mexicana*. *Evolution* 62:2643–2659.
- Tobler, M., M. Palacios, L. J. Chapman, I. Mitrofanov, D. Bierbach, M. Plath, L. Arias-Rodriguez, F. J. G. de Leon, and M. Mateos. 2011. Evolution in extreme environments: replicated phenotypic differentiation in livebearing fish inhabiting sulfidic springs. *Evolution* 65: 2213–2228.
- Thompson, J. D., T. J. Gibson, F. Plewniak, F. Jeanmougin & D. G. Higgins. 1997. The Clustal X windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. *Nucleic Acids Research* 24: 4876-4882.
- Thiessen, L.D., L.G. Campbell, L.G. and D.P. Adelizi. 2003. Digestibility and growth performance of juveniles rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fed with pea and canola products. *Aquaculture nutrition*. 9:67-75.
- Urbina-Sánchez I., C. G. Paniagua-Chávez, R. Fierro, G. Figueroa-Lucero & I. A. Barriga-Sosa. 2016. Intraspecific karyotypic variation in the silverside fish *Chirostoma humboldtianum* (Atheriniformes: Atherinopsidae). *Hidrobiológica* 26 (1): 85-93.
- Uria, G. E., M. E. Moncayo L. y R. Garibay G., 1998. Desarrollo y madurez testicular del charal *Chirisotoma humboldtianum* (Pisces: Atherinidae) del embalse Huapango, Edo. De Mexico. *Hidrobiologica* 8 (1): 9-18.
- Van Oosterhout C, Hutchinson WF, Wills DPM, Shipley P. 2004. MICRO-CHECKER: Software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite data. *Mol. Ecol. Notes* 4(3): 535–538. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-8286.2004.00684.x>
- Vandeputte, M., Quillet, E., Krieg, F., Hollebecq, M.G., Faure', A., Labbe', L., Hiseux, J.P., Chevassus, B., 2002. The “PROSPER” methodology on brown trout (*Salmo trutta fario*): four generations of improved individual selection on growth rate. Proceedings of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Montpellier, France, 19– 23 August 2002. INRA, Castanet Tolosan, France, CD-ROM communication 06-04.
- Vandeputte M. Kocour M., Mauger S., Dupont-Nivet M., De Guerry D., Rodina M., Gela D., Vallod D., Chevassus B., Otomar Linhart. 2004. Heritability estimates for growth-related traits using microsatellite parentage assignment in juvenile common carp (*Cyprinus carpio* L.). www.elsevier.com/locate/aqua-online *Aquaculture* 235 223–236
- Villeneuve, L., E. Gisbert, C.L. Cahu & J.L. Zambonino-Infante. 2005. Dietary levels of all-trans retinol affect retinoid nuclear receptor expression and skeletal development in European sea bass larvae. *Brit. J. Nutr.*, 93: 791-801.
- Verhaegen, Y., D. Adriaens, T. De Wolf, P. Dhert & P. Sorgeloos. 2007. Deformities in larval gilthead sea bream (*Sparus aurata*): a qualitative and quantitative analysis using geometric morphometrics. *Aquaculture*, 268: 156-168.
- Vrijenhoek, R. C. 1998. Conservation genetics of freshwater fish. *Journal of Fish Biology* (1998) 53 (Supplement A), 394–412 Article No. jb980830. Center for Theoretical & Applied Genetics, Rutgers University, New Brunswick, NJ 08903-0231, U.S.A
- Waldman B, McKinnon JS. 1993. Inbreeding and outbreeding in fishes, amphibians and reptiles. In: The Natural History of Inbreeding and Outbreeding: Theoretical and Empirical Perspectives. Thornhill NW (ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press, pp. 250–282, 1993.
- Wang J. & Ryman N. 2001. Genetic effects of Multiple Generation of Supportive Breeding. *Conservation Biology*, Pages 1619-1631. Vol 15, No 6
- Wang, S., J.J. Hardy & F. Utter. 2002. Salmonid inbreeding: a review. *Reviews in Fisheries Biology and Fisheries* 11:301-319

- Wang, X., K. Kim & S.C. Bai. 2002. Effects of different dietary levels of L-ascorbyl-2-polyphosphate on growth and tissue vitamin C concentrations in juvenile olive flounder, *Paralichthys olivaceus* (Temminck et Schlegel). *Aquacult. Nutr.*, 33: 261-267.
- Wang X, Xu H, Ju D, Xie Y. 2008. Disruption of Rpn4-induced proteasome expression in *Saccharomyces cerevisiae* reduces cell viability under stressed conditions. *Genetics* 180(4):1945-53
- Wang J. 2002. An estimator for pairwise relatedness using molecular markers. *Genetics*. 160:1203-1215
- Wang J. 2007. Triadic IBD coefficients and applications to estimating pairwise relatedness. *Genetics Research* 89, 135-153
- Wang J. 2011. COANCESTRY: a program for simulating, estimating and analyzing relatedness and inbreeding coefficients. *Mol Ecol Resour.* 1:141-145
- Weir BS and Cockerham CC. 1984. Estimating F-statistics for the analysis of population structure. *Evolution* 38:1358-1370.
- Williams, Sara & Hoffman, Eric. 2009. Minimizing genetic adaptation in captive breeding programs: A review. *Biological Conservation*. 142. 2388-2400. 10.1016/j.biocon.2009.05.034.
- Wright S. 1931. Evolution in Mendelian population. *Genetics* 16:97-159.
- Wright S. 1951. The genetical structure of populations. *Annals of Eugenics* 15:323-354.
- Wright S. 1969. *Evolution and Genetics of Populations*, vol.2, The theory of gene frequencies. University of Chicago Press, Chicago.
- Zohary D. 1999. Monophyletic vs. polyphyletic origin of the crops on which agriculture was founded in the Near East. *Genet Resour Crop Evol.* 1999;46:133-42.

Apéndice

1. Apéndice. Extracción de DNA

Extracción de DNA con Kit Promega Wizzard

- Cortar un pedazo de tejido (0.5-1.2) no excediendo mas de 20 mg. Colocar en un tubo eppendorf de 1.5 ml
- Adicionar 275 μ l de solución de Digestión (solución Lisis de Núcleo 200 μ l + EDTA 0.5 M pH 8.0 50 μ l + proteínasa K 20 mg/ml 20 μ l + solución RNAasa 5 μ l)
- Incubar a 55 °C de 16 a 18 horas
- Adicionar 250 μ l de Buffer de Lisis Wizzard a cada muestra y mezclar en el vortex
- Transferir cada lisado de muestra (1.5 ml) a la mini columna y ensamblar el tubo
- Centrifugar a 13 000 rpm por 3 minutos
- Remover la mini columna y verter el liquido sobrante
- Agregar 650 μ l de solución de lavado (Etanol 95%) y centrifugar a 13 000 rpm por 1 minuto
- Remover el liquido sobrenadante y repetir lavado X4
- En el ultimo lavado verter el liquido y el re ensamblaje de la mini columna, centrifugar a 13 000 rpm por 2 minutos (secado)
- Transferir mini columna a nuevo tubo eppendorf de 1.5 ml
- Agregar 250 μ l agua libre de nucleasas e incubar por 10 minutos
- Centrifugar mini columna a 13 000 rpm por 1 minuto. Sin tirar sobrenadante (DNA)
- Repetir pasos l y m para obtención de volumen final de 500 μ l
- Almacenar ADN a -20 °C

2. Apéndice. Morfología

Tabla 12. Peso en gramos y longitud en centímetros de los reproductores

ID	Peso (mg)	Longitud Total (mm)
RT 1	45000	180
RT 2	30000	156
RT Tx3	30000	160
RT Tx4	30000	170
RT Tx5	30000	160
RTx 1	30000	160
RTx 2	30000	150
RTx T3	33000	140

Tabla 13. Peso, longitud total y longitud caudal de F1 de la cruce de Tepuxtepec hembra Tiacaque macho.

ID	Peso (mg)	Longitud Total (mm)	Longitud Caudal (mm)
PTx 1	0.13	35.1	29.5
PTx 2	0.40	46.1	39.6
PTx 3	0.58	52.7	44.9
PTx 4	0.55	52.5	43.1
PTx 5	0.63	54.6	45.6
PTx 6	0.62	49.5	42.6
PTx 7	0.81	53.6	44.1
PTx 8	0.98	57.9	48.9
PTx 9	0.82	53.2	45.1
PTx 10	0.79	52.9	46.2
PTx 11	1.05	59.9	49.2
PTx 12	1.34	62.4	52.9
PTx 13	1.07	58.7	49.9
PTx 14	1.02	59.4	48.7
PTx 15	0.91	56.3	47.3
PTx 16	1.12	58.0	49.9
PTx 17	1.40	63.5	53.9
PTx 18	1.39	62.0	52.1
PTx 19	1.66	66.5	57.1
Promedio	0.908	55.51	46.87

Tabla 14. Peso, longitud total y caudal de la F1 de la cruce de Tiacaque hembra, Tepuxtepec macho.

ID	Peso (mg)	Longitud Total (mm)	Longitud Caudal (mm)
PT 1	0.015	22.5	18.9
PT 2	0.025	23.4	19.3
PT 3	0.031	25.1	18.7
PT 4	0.04	27.7	22.1
PT 5	0.086	29.9	24.9
PT 6	0.074	31.5	25.9
PT 7	0.132	34.9	29.2
PT 8	0.127	35.9	30.1
PT 9	0.175	40.1	32.1
PT 10	0.158	39.5	31.5
PT 11	0.173	38.9	32.1
PT 12	0.173	39.4	32.5
PT 13	0.161	39	33.4
PT 14	0.218	40.7	33.9
PT 15	0.258	43.9	35.7
PT 16	0.609	50	41.2
PT 17	0.550	44.5	39.2
PT 18	0.552	46.2	37.8
PT 19	0.760	51.8	43.4
PT 20	0.347	41	34.6
PT 21	0.526	45.4	38.5
PT 22	0.568	46.9	41.6
PT 23	0.931	53.8	47.8
PT 24	0.880	53.8	47.8

PT 25	0.734	52.6	44.8
PT 26	0.879	52.5	46.9
PT 27	0.721	50.2	43.4
PT 28	0.348	40.1	34.2
PT 29	0.775	53	46.7
PT 30	0.494	44.9	38.2
PT 31	1.376	63.1	52.5
PT 32	0.837	54.4	47
PT 33	0.875	54.1	47.1
PT 34	0.815	51.5	46.5
PT 35	0.580	48.4	41
PT 36	0.635	49	41.7
PT 37	0.382	42.6	36.7
PT 38	0.786	52.5	44.8
PT 39	0.344	41.2	34.5
PT 40	0.562	47.8	39
PT 41	0.753	52.5	45.5
PT 42	0.700	51.3	42.6
PT 43	0.448	41.8	35.4
PT 44	0.744	51.2	42.5
PT 45	0.538	57.5	39.9
PT 46	0.592	47.9	40.5
PT 47	0.424	44	37
PT 48	0.455	43.9	38
Promedio	0.480512	44.292	37.354

3. Apéndice. Genética

Tabla 15. Número total de alelos observados por locus

Locus	Alelos
Chum12	8
Chum14	9
Chum44	11
Chum55	6
Chum58	13
Chum60	7
Chum62	16
Chum69	17
Total	87
Promedio	10.87

Tabla 16. Frecuencias alélicas por locus y por población analizada. Rep Tx= Reproductores Tepuxtepec hembra Tiacaque macho; Rep T= Reproductores Tiacaque hembra Tepuxtepec macho; PTx= progenie de la cruza RepTx; PT= progenie de la cruza RepT. Los números en negritas indican los alelos privados o únicos.

Locus	Alelo	Frecuencia alelica <i>Chirostoma humboldtianum</i>						
		Tiacaque	Tepuxtepec	Rep Tx	Rep T	P Tx	PT	Overall
Chum 12	% missing	0	0	0	0	0	0.121	0.041
	112	0.552	0.104	0.167	0.2	0.158	0	0.22
	120	0.365	0.614	0.5	0.2	0	0	0.302
	128	0.083	0.042	0.333	0.2	0.211	0.402	0.201
	136	0	0.188	0	0	0	0	0.055
	144	0	0.042	0	0	0	0	0.012
	152	0	0.01	0	0	0.053	0.024	0.015
	188	0	0	0	0	0	0.063	0.018
	192	0	0	0	0.4	0.578	0.511	0.177
	Total	1	1	1	1	1	1	
Chum 14	% missing	0	0	0	0	0	0.042	0.012
	112	0	0.021	0	0	0.118	0	0.019
	140	0	0	0	0.8	0.706	0.951	0.34
	144	0	0	0	0.2	0.176	0.049	0.037
	176	0.021	0	0	0	0	0	0.006
	180	0.5	0	0	0	0	0	0.148
	184	0.187	0.041	0.333	0	0	0	0.074
	188	0.104	0	0.001	0	0	0	0.031
	192	0.146	0.49	0.333	0	0	0	0.194
	196	0.042	0.448	0.333	0	0	0	0.151
	Total	1	1	1	1	1	1	
Chum 44	% missing	0	0	0	0	0	0.042	0.012
	132	0	0	0	0.2	0	0.043	0.018
	140	0.146	0.354	0.333	0	0.289	0.043	0.192
	144	0.042	0.083	0	0.1	0	0.067	0.056
	148	0.031	0.01	0	0.1	0	0.141	0.053
	152	0	0.042	0	0	0	0	0.012
	156	0.073	0.281	0.333	0	0	0.011	0.111
	160	0.604	0.166	0.333	0.5	0.711	0.673	0.503
	164	0.104	0	0.001	0.1	0	0.022	0.038
	172	0	0.033	0	0	0	0	0.009
	176	0	0.031	0	0	0	0	0.009
	Total	1	1	1	1	1	1	
Chum 55	% missing	0	0	0	0	0.053	0.125	0.041
	300	0	0.42708	0.33333	0.2	0	0	0.137
	312	0	0.11458	0	0.1	0	0	0.037
	316	0.166	0.07292	0	0.3	0.05556	0	0.085
	320	0.479	0.26042	0.5	0.2	0.33333	0.92857	0.506

	324	0.032	0.04167	0.16667	0.2	0.61111	0.07143	0.021
	328	0.323	0.08333	0	0	0	0	0.213
	Total	1	1	1	1	1	1	
Chum58	% missing	0	0	0	0	0	0.062	0.018
	256	0.042	0	0	0.2	0.552	0.31	0.164
	264	0.271	0	0	0	0	0	0.077
	268	0.062	0	0	0	0	0	0.018
	276	0.562	0.042	0.333	0.4	0.132	0.289	0.283
	280	0.063	0.01	0	0	0.053	0.067	0.045
	284	0	0.146	0	0.2	0.263	0.267	0.149
	288	0	0.052	0	0	0	0	0.015
	292	0	0.25	0.333	0.1	0	0.067	0.098
	296	0	0.146	0	0	0	0	0.042
	304	0	0.021	0	0	0	0	0.006
	308	0	0.073	0.333	0	0	0	0.027
	316	0	0.198	0.001	0	0	0	0.057
	336	0	0.062	0	0.1	0	0	0.021
	Total	1	1	1	1	1	1	
Chum 60	% missing	0	0	0	0	0	0.125	0.035
	240	0	0.281	0	0	0	0	0.082
	244	0	0.062	0.167	0	0	0	0.021
	256	0.792	0.104	0.167	0.4	0.711	0.464	0.476
	260	0.083	0.323	0.333	0	0	0	0.124
	264	0.094	0.094	0	0.3	0.289	0.536	0.233
	268	0.01	0.053	0	0	0	0	0.018
	276	0.021	0.083	0.333	0.3	0	0	0.045
	Total	1	1	1	1	1	1	
	% missing	0	0	0	0	0.053	0.104	0.035
Chum 62	236	0.24	0	0.5	0.4	0.111	0.326	0.188
	240	0.604	0	0.166	0.2	0.333	0.674	0.397
	264	0	0.031	0	0	0	0	0.009
	272	0.125	0.031	0	0.2	0.306	0	0.085
	276	0.031	0.021	0	0	0	0	0.015
	280	0	0.01	0	0.2	0.111	0	0.021
	284	0	0.156	0	0	0.028	0	0.048
	288	0	0.138	0	0	0	0	0.039
	296	0	0.073	0.167	0	0	0	0.024
	304	0	0.115	0.167	0	0.111	0	0.048
	312	0	0.062	0	0	0	0	0.018
	316	0	0.083	0	0	0	0	0.024
	320	0	0.01	0	0	0	0	0.003
	328	0	0.135	0	0	0	0	0.039

	332	0	0.073	0	0	0	0	0.021
	340	0	0.062	0	0	0	0	0.018
	Total	1	1	1	1	1	1	
Chum 69	% missing	0	0	0	0	0.158	0.125	0.053
	192	0	0.021	0	0	0	0	0.006
	200	0	0.021	0	0	0	0	0.006
	232	0	0	0	0.2	0	0.071	0.025
	244	0	0.042	0	0	0	0	0.012
	252	0	0.042	0	0	0	0	0.012
	256	0	0.021	0	0	0	0	0.006
	260	0	0.042	0	0	0	0	0.012
	264	0.01	0.083	0	0	0	0	0.028
	268	0.042	0.144	0	0	0	0	0.056
	272	0.073	0.042	0.667	0.4	0	0.024	0.065
	276	0.771	0.104	0	0.1	0.125	0.06	0.29
	280	0.01	0.25	0.333	0	0	0	0.083
	284	0.021	0.042	0	0.3	0.875	0.845	0.333
	288	0.021	0.041	0	0	0	0	0.019
	292	0.052	0.021	0	0	0	0	0.022
	296	0	0.042	0	0	0	0	0.012
	304	0	0.042	0	0	0	0	0.012
	Total	1	1	1	1	1	1	

Tabla 17. F_{ST} pareadas para las muestras/poblaciones silvestres Tiacaque y Tepuxtepec, los reproductores y su F1. Los * muestran los valores que fueron significativos.

	<i>Tiacaque</i>	<i>Tepuxtepec</i>	<i>Rep Tx</i>	<i>Rep T</i>	<i>F1 PTx</i>	<i>F1 PT</i>
<i>Tiacaque</i>	0					
<i>Tepuxtepec</i>	0.23876*	0				
<i>Rep Tx</i>	0.15731	0.02569	0			
<i>Rep T</i>	0.11439	0.13019*	0.02248	0		
<i>F1 PTx</i>	0.18116*	0.24783*	0.23346*	0.08139	0	
<i>F1 PT</i>	0.19566*	0.27935*	0.23796*	0.13209*	0.1646*	0

Figura 16. Gráfico de estructura génica realizado con el programa STRUCTURE. Se observan tres grupos genéticos o con una $K=3$. Cada individuo es una línea vertical. Grupo 1=Tiacaque azul, 2=Tepuxtepec verde y 3 y 4= reproductores, 5 y 6 F1 rojo.

Figura 17. Ejemplo de electroferograma de organismos tetraploides para locus Chum 69 (PTx10) en la cruce de Tx ♀ X T ♂. La imagen es sin zoom, visualizado en programa PeakScanner.

Cruzas de reproductores de *Chirostoma humboldtianum*

Tabla 18. Representación de las diferentes cruzas realizadas con organismos reproductores en cautiverio de la PExPA.

<i>Tiacaque</i> ♀ X <i>Tepuxtepec</i> ♂		<i>Tepuxtepec</i> ♀ X <i>Tiacaque</i> ♂	
Hembras	Machos	Hembras	Machos
RT1	RTx3	RTx1	RT3
RT1	RTx4	RTx2	RT3
RT1	RTx5		
RT2	RTx3		
RT2	RTx4		
RT2	RTx5		

Tabla 19. Pedigree resueltos para individuos asignados en las diferentes cruzas de cada reproductor. RT= Reproductor de *Tiacaque*; RTx= Reproductor de *Tepuxtepec*; PT=Progenie de la cruce *Tiacaque* ♀ X *Tepuxtepec* ♂ y PTx= progenie de la cruce de *Tepuxtepec* ♀ X *Tiacaque* ♂; progenie asignado a cada reproductor; n= al número total de individuos en esa cruce.

<i>Cruzas Tiacaque</i> ♀ X <i>Tepuxtepec</i> ♂						<i>Tepuxtepec</i> ♀ X <i>Tiacaque</i> ♂	
RT1 X RTx3	RT1 X RTx4	RT1 X RTx5	RT2 X RTx3	RT2 X RTx4	RT2 X RTx5	RTx1 X RT3	RTx2 X RT3
T19	PT1	PT2	PT8	PT6	PT28	PTx2	PTx1
PT21	PT3	PT5	PT9	PT7	PT38	PTx5	PTx3
PT24	PT4	PT12	PT13	PT10	PT41	PTx6	PTx4
PT26	PT11	PT32	PT14	PT16	PT46	PTx7	PTx12
PT39	PT23	PT48	PT15	PT17		PTx8	PTx13
PT44	PT29		PT18	PT25		PTx9	PTx14
PT45	PT33		PT20	PT27		PTx10	PTx15
	PT36		PT22	PT31		PTx11	PTx19
	PT40		PT30	PT34		PTx16	
	PT43		PT37	PT35		PTx17	
				PT42		PTx18	
				PT47			
n=7	n=10	n=5	n=10	n=12	n=4	n=11	n=8

El jurado designado por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la
unidad Iztapalapa aprobó la tesis que presentó:

Karen Yazmín Ruiz Mondragón

COTUTORES DE TESIS:

El día 9 de diciembre del 2019

Codirectores:

DRA. IRENE DE LOS ANGELES BARRIGA SOSA (Tutor)

DR. GERARDO FIGUEROA LUCERO (Tutor)

Jurado:

DR. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO PORTILLA (Presidente)

DRA. ERIKA MAGALLÓN GAYÓN (Secretaria)

DRA. GABRIELA CASTELLANOS MORALES (Vocal)

DRA. ROSA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ (Vocal)

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ACTA DE EXAMEN DE GRADO

No. 00166

Matrícula: 2173801479

Caracterización morfológica y genética de progenitores y progenie de dos poblaciones silvestres de *Chiostoma humboldtianum* (Valenciennes, 1835)

En la Ciudad de México, se presentaron a las 11:00 horas del día 9 del mes de diciembre del año 2019 en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, los suscritos miembros del jurado:

DR. MIGUEL ANGEL DEL RIO PORTILLA
DRA. ROSA MARIA GARCIA MARTINEZ
DRA. GABRIELA CASTELLANOS MORALES
DRA. ERIKA MAGALLON GAYON

KAREN YAZMIN RUIZ MONDRAGON
ALUMNA

Bajo la Presidencia del primero y con carácter de Secretaria la última, se reunieron para proceder al Examen de Grado cuya denominación aparece al margen, para la obtención del grado de:

MAESTRA EN BIOLOGIA

DE: KAREN YAZMIN RUIZ MONDRAGON

y de acuerdo con el artículo 78 fracción III del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, los miembros del jurado resolvieron:

Aprobar

Acto continuo, el presidente del jurado comunicó a la interesada el resultado de la evaluación y, en caso aprobatorio, le fue tomada la protesta.

REVISÓ

MTRA. ROSALIA SERRANO DE LA PAZ
DIRECTORA DE SISTEMAS ESCOLARES

DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE CBS

DRA. SARA LUCIA CAMARGO RICALDE

PRESIDENTE

DR. MIGUEL ANGEL DEL RIO PORTILLA

VOCAL

DRA. ROSA MARIA GARCIA MARTINEZ

VOCAL

DRA. GABRIELA CASTELLANOS MORALES

SECRETARIA

DRA. ERIKA MAGALLON GAYON